

Welche Seltenheiten sollen an die AFK gemeldet werden?

Which species should be reported to the AFK?

Letzte Änderung/updated: 25.9.2016

Herausgegeben von der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich (www.birdlife-afk.at)
Published by the Austrian Avifaunistic Committee (AFK) of BirdLife Austria



Eine Legende der Einschränkungen der Meldepflicht (Kennzeichnung durch hochgestellte Ziffern) und die zuletzt vorgenommenen Änderungen der Liste finden sich auf Seite 2 dieses Dokuments.

Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, wenn Arten nach Revisionen von der österreichischen Artenliste gestrichen wurden oder durch anerkannte Erstnachweise neue Arten hinzugekommen sind. Außerdem erfolgen Aktualisierungen, um systematische und taxonomische Änderungen in der österreichischen Artenliste zu übernehmen. Die folgende Liste jener Arten bzw. Unterarten, die an die Avifaunistische Kommission (mittels des Online-Meldeformulars auf birdlife-afk.at) gemeldet werden sollen, enthält nur Arten, die bisher als Wildvögel oder aus verwilderten Populationen stammend in Österreich nachgewiesen worden sind. Zusätzlich sind Beobachtungen von Arten oder Unterarten, die bisher noch nicht in Österreich als Wildvogel festgestellt worden sind und bei denen ein Auftreten als Wildvogel vermutet wird an die AFK zu melden.

Zwergschwan ³ (<i>Cygnus columbianus</i>)	Amerikanischer Goldregenpfeifer (<i>Pluvialis dominica</i>)	Bachstelze ⁴ (<i>Motacilla alba</i> ; alle Unterarten außer <i>alba</i>)
Kurzschwanzgans (<i>Anser brachyrhynchus</i>)	Steppenkiebitz (<i>Vanellus gregarius</i>)	Bergbraunelle (<i>Prunella montanella</i>)
Blässgans (<i>Anser albifrons</i> ; alle ssp. außer <i>albifrons</i>)	Weißschwanzkiebitz (<i>Vanellus leucurus</i>)	Alpenbraunelle ⁵ (<i>Prunella collaris</i>)
Zwerggans (<i>Anser erythropus</i>)	Weißbürzel-Strandläufer (<i>Calidris fuscicollis</i>)	Sprosser (<i>Luscinia luscinia</i>)
Weißwangengans ^{1,7} (<i>Branta leucopsis</i>)	Bairdstrandläufer (<i>Calidris bairdii</i>)	Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros</i> ; alle Unterarten außer <i>gibraltariensis</i>)
Ringelgans (<i>Branta bernicla</i>)	Graubrust-Strandläufer (<i>Calidris melanotos</i>)	Sibirisches Schwarzkehlchen (<i>Saxicola maurus</i>)
Rothalsgans ^{1,7} (<i>Branta ruficollis</i>)	Sandstrandläufer (<i>Calidris pusilla</i>)	Isabellsteinschmätzer (<i>Oenanthe isabellina</i>)
Nordamerikanische Pfeifente (<i>Anas americana</i>)	Spitzschwanz-Strandläufer (<i>Calidris acuminata</i>)	Nonnensteinschmätzer (<i>Oenanthe pleschanka</i>)
Sichelente (<i>Anas falcata</i>)	Meerstrandläufer (<i>Calidris maritima</i>)	Mittelmeer-Steinschmätzer (<i>Oenanthe hispanica</i>)
Amerikanische Krickente (<i>Anas carolinensis</i>)	Sumpfläufer ¹ (<i>Limicola falcinellus</i>)	Wüstensteinschmätzer (<i>Oenanthe deserti</i>)
Blaufügelente (<i>Anas discors</i>)	Grasläufer (<i>Tryngites subruficollis</i>)	Steinrötel ⁶ (<i>Monticola saxatilis</i>)
Ringschnabelente (<i>Aythya collaris</i>)	Doppelschnepfe ² (<i>Gallinago media</i>)	Blaumerle (<i>Monticola solitarius</i>)
Kragenente (<i>Histrionicus histrionicus</i>)	Dünnschnabel-Brachvogel (<i>Numenius tenuirostris</i>)	Erddrossel (<i>Zoothera dauma</i>)
Schwarzkopf-Ruderente (<i>Oxyura jamaicensis</i>)	Terekwasserläufer (<i>Xenus cinereus</i>)	Rostschwanzdrossel (<i>Turdus naumanni</i>)
Weißkopf-Ruderente (<i>Oxyura leucocephala</i>)	Drosselraumböwe (<i>Stercorarius longicaudus</i>)	Rostflügeldrossel (<i>Turdus eunomus</i>)
Steinhuhn ⁶ (<i>Alectoris graeca</i>)	Kleiner Gelbschenkel (<i>Tringa flavipes</i>)	Schwarzkehlrossel (<i>Turdus atrogularis</i>)
Eistaucher (<i>Gavia immer</i>)	Thorshühnchen (<i>Phalaropus fulicarius</i>)	Wanderdrossel (<i>Turdus migratorius</i>)
Gelbschnabeltaucher (<i>Gavia adamsii</i>)	Spatelraumböwe (<i>Stercorarius pomarinus</i>)	Seidensänger (<i>Cettia cetti</i>)
Sepiasturmtaucher (<i>Calonectris diomedea</i>)	Schmarotzerraumböwe (<i>Stercorarius parasiticus</i>)	Cistensänger (<i>Cisticola juncidis</i>)
Mittelmeer-Sturmtaucher (<i>Puffinus yokouan</i>)	Falkenraumböwe (<i>Stercorarius longicaudus</i>)	Buschspötter (<i>Iduna caligata</i>)
Sturmschwalbe (<i>Hydrobates pelagicus</i>)	Skua (<i>Stercorarius skua</i>)	Blassspötter (<i>Iduna pallida</i>)
Wellenläufer (<i>Oceanodroma leucorhoa</i>)	Fischnöwe (<i>Larus ichthyætos</i>)	Orpheusspötter (<i>Hippolais polyglotta</i>)
Basstölpel (<i>Morus bassanus</i>)	Dünnschnabelmöwe (<i>Larus genei</i>)	Mariskensänger ⁶ (<i>Acrocephalus melanopogon</i>)
Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i> ; nur Unterart <i>carbo</i>)	Ringschnabelmöwe (<i>Larus delawarensis</i>)	Seggenrohrsänger (<i>Acrocephalus paludicola</i>)
Krähenscharbe (<i>Phalacrocorax aristotelis</i>)	Tundramöwe ⁴ (<i>Larus fuscus heuglini</i>)	Feldrohrsänger (<i>Acrocephalus agricola</i>)
Zwergscharbe ⁵ (<i>Phalacrocorax pygmeus</i>)	Polarmöwe (<i>Larus glaucoides</i>)	Weißbart-Grasmücke (<i>Sylvia cantillans</i>)
Rosapelikan (<i>Pelecanus onocrotalus</i>)	Eismöwe (<i>Larus hyperboreus</i>)	Samtkopf-Grasmücke (<i>Sylvia melanocephala</i>)
Krauskopfpelikan (<i>Pelecanus crispus</i>)	Mantelmöwe (<i>Larus marinus</i>)	Orpheusgrasmücke (<i>Sylvia hortensis</i>)
Kuhreiher (<i>Bubulcus ibis</i>)	Dreizehenmöwe (<i>Rissa tridactyla</i>)	Grünlaubsänger (<i>Phylloscopus trochiloides</i>)
Sichler (<i>Plegadis falcinellus</i>)	Schwalbenmöwe (<i>Xema sabini</i>)	Goldhähnchen-Laubsänger (<i>Phylloscopus proregulus</i>)
Rosaflamingo (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	Lachseeschwalbe (<i>Gelochelidon nilotica</i>)	Gelbbrauen-Laubsänger (<i>Phylloscopus inornatus</i>)
Gleitaar (<i>Elanus caeruleus</i>)	Rüppellseeschwalbe (<i>Sterna bengalensis</i>)	Dunkellaubsänger (<i>Phylloscopus fuscatus</i>)
Schmutzgeier (<i>Neophron percnopterus</i>)	Brandseeschwalbe ³ (<i>Sterna sandvicensis</i>)	Zilpzalp ⁴ (<i>Phylloscopus collybita</i> ; nur Unterart <i>tristis</i>)
Gänsegeier ⁶ (<i>Gyps fulvus</i>)	Rosenseeschwalbe (<i>Sterna dougallii</i>)	Halbringsschnäpper (<i>Ficedula semitorquata</i>)
Mönchsgeier (<i>Aegypius monachus</i>)	Küstenseeschwalbe (<i>Sterna paradisaea</i>)	Lasurmeise (<i>Parus cyanus</i>)
Schlangenadler (<i>Circaetus gallicus</i>)	Dickschnabellumme (<i>Uria lomvia</i>)	Isabellwürger (<i>Lanius isabellinus</i>)
Steppenweihe (<i>Circus macrourus</i>)	Tordalk (<i>Alca torda</i>)	Schwarzstirnwürger (<i>Lanius minor</i>)
Kurzfangsperber (<i>Accipiter brevipes</i>)	Trottellumme (<i>Uria aalge</i>)	Raubwürger (<i>Lanius excubitor</i> , alle Unterarten außer <i>excubitor</i>)
Adlerbussard (<i>Buteo rufinus</i>)	Krabbentaucher (<i>Alle alle</i>)	Rotkopfwürger (<i>Lanius senator</i>)
Schreiadler (<i>Aquila pomarina</i>)	Papageitaucher (<i>Fratercula arctica</i>)	Alpendohle ⁶ (<i>Pyrrhocorax graculus</i>)
Schelladler (<i>Aquila clanga</i>)	Steppenflughuhn (<i>Syrhaptes paradoxus</i>)	Alpenkrähe (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)
Kaiseradler ⁶ (<i>Aquila heliaca</i>)	Orienturteltaube (<i>Streptopelia orientalis</i>)	Rosenstar (<i>Pastor roseus</i>)
Steppenadler (<i>Aquila nipalensis</i>)	Häherkuckuck (<i>Ciamator glandarius</i>)	Steinsperling (<i>Petronia petronia</i>)
Steinadler ⁶ (<i>Aquila chrysaetos</i>)	Schnee-Eule (<i>Bubo scandiavicus</i>)	Schneesperling ⁶ (<i>Montifringilla nivalis</i>)
Zwergadler (<i>Aquila pennata</i>)	Sperbereule (<i>Surnia ulula</i>)	Zitronengirlitz ² (<i>Serinus citrinella</i>)
Habichtsadler (<i>Aquila fasciata</i>)	Alpensegler ⁶ (<i>Apus melba</i>)	Berghänfling ¹ (<i>Carduelis flavirostris</i>)
Rötelfalke (<i>Falco naumanni</i>)	Blauracke ⁶ (<i>Coracias garrulus</i>)	Bindenkreuzschnabel (<i>Loxia leucoptera</i>)
Sakerfalke ⁶ (<i>Falco cherrug</i>)	Kalanderlerche (<i>Melanocorypha calandra</i>)	Kiefernkreuzschnabel (<i>Loxia pytyopsittacus</i>)
Gerfalke (<i>Falco rusticolus</i>)	Weißflügellerche (<i>Melanocorypha leucoptera</i>)	Wüstengimpel (<i>Bucanetes githagineus</i>)
Zwergsumphuhn (<i>Porzana pusilla</i>)	Mohrenlerche (<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>)	Hakengimpel (<i>Pinicola enucleator</i>)
Purpurhuhn (<i>Porphyrio porphyrio</i>)	Kurzzeilenlerche (<i>Calandrella brachydactyla</i>)	Spornammer (<i>Calcarius lapponicus</i>)
Zwergtrappe (<i>Tetrax tetrax</i>)	Stummellerche (<i>Calandrella rufescens</i>)	Fichtenammer (<i>Emberiza leucocephalos</i>)
Steppenkranttrappe (<i>Chlamydotis macqueenii</i>)	Ohrenlerche (<i>Eremophila alpestris</i>)	Zaunammer (<i>Emberiza cirius</i>)
Rennvogel (<i>Cursorius cursor</i>)	Felsenschwalbe ⁶ (<i>Ptyonoprogne rupestris</i>)	Grauortolan (<i>Emberiza caesia</i>)
Rotflügel-Brachschwalbe (<i>Glareola pratincola</i>)	Rötelschwalbe (<i>Cecropis daurica</i>)	Waldammer (<i>Emberiza rustica</i>)
Schwarzflügel-Brachschwalbe (<i>Glareola nordmanni</i>)	Spornpieper (<i>Anthus richardi</i>)	Zwergammer (<i>Emberiza pusilla</i>)
Seeregenpfeifer ^{1,3} (<i>Charadrius alexandrinus</i>)	Waldpieper (<i>Anthus hodgsoni</i>)	Kappenammer (<i>Emberiza melanocephala</i>)
Wüstenregenpfeifer (<i>Charadrius leschenaultii</i>)	Schafstelze (<i>Motacilla flava</i> ; alle Unterarten außer <i>cinereocapilla</i> , <i>feldegg</i> , <i>flava</i> , <i>thunbergi</i>)	
Mornellregenpfeifer ⁶ (<i>Charadrius morinellus</i>)	Zitronenstelze (<i>Motacilla citreola</i>)	
Pazifischer Goldregenpfeifer (<i>Pluvialis fulva</i>)		

Legende

¹ nur Feststellungen abseits des Neusiedler See/Seewinkel.

² wie oben, gilt aber nur für Frühjahrszug.

³ nur Feststellungen abseits des Bodenseegebietes.

⁴ nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung werden behandelt.

⁵ nur Feststellungen außerhalb des Burgenlandes und abseits der steirischen Bezirke Südoststeiermark, Leibnitz, Hartberg-Fürstenfeld, Graz und Graz Umgebung.

⁶ nur Feststellungen abseits der etablierten Brut- (siehe z.B. Dvorak et al., Atlas der Brutvögel Österreichs, 1993), Sommer-, Zug- und Winterverbreitungsgebiete.

⁷ nur sofern angenommen wird, dass es sich um Wildvögel und nicht um freigesetzte, entkommene bzw. verwilderte Vögel handelt. Neben der Beschreibung des Vogels sind vor allem die Beobachtungsumstände, die zu dieser Annahme führten, zu detaillieren.

Änderungen

Änderungen ab 1.7.2016: Nachweise der Zwergscharbe aus dem gesamten Burgenland, sowie aus den steirischen Bezirken Südoststeiermark, Leibnitz, Hartberg-Fürstenfeld, Graz und Graz Umgebung werden künftig nicht mehr behandelt. Ebenfalls fällt die Protokollpflicht für Beobachtungen des Raufußbussards aus ganz Österreich.

Änderung ab 8.12.2012: Aufgrund neuer Erkenntnisse zur sicheren Bestimmung werden Nachweise aller Unterarten der Bachstelze (außer *alba*, insbesondere *yarrellii*) nur mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

Änderungen ab 1.1.2010: Für die folgenden Arten sind keine Dokumentationen an die AFK mehr erforderlich. Für alle diese Arten wird aber ersucht, die Beobachtungen via www.ornitho.at an BirdLife Österreich zu melden.

- Rostgans: Wildvögel können ohnedies nicht mehr gesichert nachgewiesen werden (außer über Ringfunde) und alle anderen Nachweise der Kategorien C und E werden nicht von der AFK gesammelt.
- Bartgeier: Wildvögel können im Alpenraum aufgrund des Wiedereinbürgerungsprogrammes nicht von Vögeln der Kategorie D/E bzw. zukünftig C getrennt werden. Es wird jedoch explizit ersucht alle Meldungen von Bartgeiern an das Monitoringprogramm (z.B. bartgeier@gmx.at) zu melden.
- Zwergohreule
- Habichtskauz: 2009 begonnenes Aussetzungsprogramm im Wienerwald und im Dürrensteingebiet; Vögel des Aussetzungsprogrammes aus dem Böhmerwald; etabliertes Brutvorkommen in Kärnten.
- Doppelschnepfen müssen im Frühjahr nur mehr abseits des Neusiedler See-Gebietes an die AFK gemeldet werden (alljährlicher Durchzügler im Frühjahr).
- Zwergseeschwalbe

Folgende Arten wurden in die Liste der zu meldenden Arten aufgenommen bzw. bisher geltende räumliche Einschränkungen gestrichen:

- Sichler: nunmehr auch aus dem Neusiedler See-Gebiet an die AFK melden.
- Mantelmöwe: nunmehr auch aus dem Bodenseegebiet an die AFK melden. Bei beiden Arten sind die entsprechenden Nachweise derart zurückgegangen, dass eine uneingeschränkte Aufnahme in die Liste der zu meldenden Arten erforderlich ist.
- Raufußbussard: neu abseits der etablierten Winterverbreitungsgebiete (NÖ und N-Burgenland) an die AFK melden. Eine Durchsicht der Nachweise dieser Art abseits des genannten Raumes zeigte die Seltenheit der Art und die mangelhafte Dokumentation über Belege (Fotos).
- Neu nachgewiesene Unterarten: Kormoran der atlantischen Unterart *carbo* sowie Tundramöwe (*Larus fuscus heuglini*). Von letzterer werden (so wie von der Unterart *tristis* des Zilpzalps) aufgrund der ausgesprochen schwierigen Bestimmung nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

Änderungen ab 29.11.2009: Zwergscharben müssen rückwirkend ab 2009 aus dem Neusiedler See-Gebiet nicht mehr an die AFK gemeldet werden (etablierter Brutvogel, Mauseergast, je nach Vereisung auch im Winter anwesend).

