

Welche Seltenheiten sollen an die AFK gemeldet werden?

Which species should be reported to the AFK?



Letzte Änderung/updated: 5.12.2017

Herausgegeben von der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich (www.birdlife-afk.at)
Published by the Austrian Avifaunistic Committee (AFK) of BirdLife Austria

Eine Legende der Einschränkungen der Meldepflicht (Kennzeichnung durch hochgestellte Ziffern) und die zuletzt vorgenommenen Änderungen der Liste finden sich auf Seite 2 dieses Dokuments.

Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, wenn Arten nach Revisionen von der österreichischen Artenliste gestrichen wurden oder durch anerkannte Erstnachweise neue Arten hinzugekommen sind. Außerdem erfolgen Aktualisierungen, um systematische und taxonomische Änderungen in der österreichischen Artenliste zu übernehmen. Die folgende Liste jener Arten bzw. Unterarten, die an die Avifaunistische Kommission (mittels des Online-Meldeformulars auf birdlife-afk.at) gemeldet werden sollen, enthält nur Arten, die bisher als Wildvögel oder aus verwilderten Populationen stammend in Österreich nachgewiesen worden sind. Zusätzlich sind Beobachtungen von Arten oder Unterarten, die bisher noch nicht in Österreich als Wildvogel festgestellt worden sind und bei denen ein Auftreten als Wildvogel vermutet wird an die AFK zu melden.

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zwergschwan ³ (<i>Cygnus columbianus</i>) | Graubrust-Strandläufer (<i>Calidris melanotos</i>) | Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros</i> ; alle Unterarten außer <i>gibraltariensis</i>) |
| Kurzschnabelgans (<i>Anser brachyrhynchus</i>) | Sandstrandläufer (<i>Calidris pusilla</i>) | Sibirisches Schwarzkehlchen (<i>Saxicola maurus</i>) |
| Blässgans (<i>Anser albifrons</i> ; alle ssp. außer <i>albifrons</i>) | Spitzschwanz-Strandläufer (<i>Calidris acuminata</i>) | Isabellsteinschmätzer (<i>Oenanthe isabellina</i>) |
| Zwerggans ¹ (<i>Anser erythropus</i>) | Meerstrandläufer (<i>Calidris maritima</i>) | Nonnensteinschmätzer (<i>Oenanthe pleschanka</i>) |
| Ringelgans (<i>Branta bernicla</i>) | Sumpfläufer ¹ (<i>Limicola falcinellus</i>) | Mittelmeer-Steinschmätzer (<i>Oenanthe hispanica</i>) |
| Rothalsgans ^{1,7} (<i>Branta ruficollis</i>) | Grasläufer (<i>Tryngites subruficollis</i>) | Wüstensteinschmätzer (<i>Oenanthe deserti</i>) |
| Nordamerikanische Pfeifente (<i>Anas americana</i>) | Doppelschnepfe ² (<i>Gallinago media</i>) | Steinrötel ⁶ (<i>Monticola saxatilis</i>) |
| Sichelente (<i>Anas falcata</i>) | Dünnschnabel-Brachvogel (<i>Numenius tenuirostris</i>) | Blaumerle (<i>Monticola solitarius</i>) |
| Amerikanische Krickente (<i>Anas carolinensis</i>) | Terekwasserläufer (<i>Xenus cinereus</i>) | Erddrossel (<i>Zoothera dauma</i>) |
| Blaufügelente (<i>Anas discors</i>) | Drosseluferläufer (<i>Actitis macularius</i>) | Rostschwanzdrossel (<i>Turdus naumanni</i>) |
| Ringschnabelente (<i>Aythya collaris</i>) | Kleiner Gelbschenkel (<i>Tringa flavipes</i>) | Rostflügeldrossel (<i>Turdus eunomus</i>) |
| Kragente (<i>Histrionicus histrionicus</i>) | Thorshühnchen (<i>Phalaropus fulicarius</i>) | Schwarzkehlrossel (<i>Turdus atrogularis</i>) |
| Schwarzkopf-Ruderente (<i>Oxyura jamaicensis</i>) | Spatelraubmöwe (<i>Stercorarius pomarinus</i>) | Wanderdrossel (<i>Turdus migratorius</i>) |
| Weißkopf-Ruderente (<i>Oxyura leucocephala</i>) | Schmarotzerraubmöwe (<i>Stercorarius parasiticus</i>) | Seidensänger (<i>Cettia cetti</i>) |
| Steinhuhn ⁶ (<i>Alectoris graeca</i>) | Falkenraubmöwe (<i>Stercorarius longicaudus</i>) | Cistensänger (<i>Cisticola juncidis</i>) |
| Eistaucher (<i>Gavia immer</i>) | Skua (<i>Stercorarius skua</i>) | Buschspötter (<i>Iduna caligata</i>) |
| Gelbschnabeltaucher (<i>Gavia adamsii</i>) | Fischmöwe (<i>Larus ichthyaetus</i>) | Blassspötter (<i>Iduna pallida</i>) |
| Sepiasturtaucher (<i>Calonectris diomedea</i>) | Dünnschnabelmöwe (<i>Larus genei</i>) | Orpheusspötter (<i>Hippolais polyglotta</i>) |
| Mittelmeer-Sturmtaucher (<i>Puffinus yelkouan</i>) | Ringschnabelmöwe (<i>Larus delawarensis</i>) | Mariskensänger ⁶ (<i>Acrocephalus melanopogon</i>) |
| Sturmschwalbe (<i>Hydrobates pelagicus</i>) | Tundramöwe ⁴ (<i>Larus fuscus heuglini</i>) | Seggenrohrsänger (<i>Acrocephalus paludicola</i>) |
| Wellenläufer (<i>Oceanodroma leucorhoa</i>) | Polarmöwe (<i>Larus glaucoides</i>) | Feldrohrsänger (<i>Acrocephalus agricola</i>) |
| Basstöpel (<i>Morus bassanus</i>) | Eismöwe (<i>Larus hyperboreus</i>) | Buschrohrsänger (<i>Acrocephalus dumetorum</i>) |
| Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i> ; nur Unterart <i>carbo</i>) | Mantelmöwe (<i>Larus marinus</i>) | Weißbart-Grasmücke (<i>Sylvia cantillans</i>) |
| Krähenscharbe (<i>Phalacrocorax aristotelis</i>) | Dreizehenmöwe (<i>Rissa tridactyla</i>) | Samtkopf-Grasmücke (<i>Sylvia melanocephala</i>) |
| Rosapelikan (<i>Pelecanus onocrotalus</i>) | Schwalbenmöwe (<i>Xema sabini</i>) | Orpheusgrasmücke (<i>Sylvia hortensis</i>) |
| Krauskopfpelikan (<i>Pelecanus crispus</i>) | Lachseeschwalbe (<i>Gelocheidon nilotica</i>) | Grünlaubsänger (<i>Phylloscopus trochiloides</i>) |
| Kuhreiher ^{1,3} (<i>Bubulcus ibis</i>) | Rüppellseeschwalbe (<i>Sterna bengalensis</i>) | Goldhähnchen-Laubsänger (<i>Phylloscopus proregulus</i>) |
| Sichler (<i>Plegadis falcinellus</i>) | Brandseeschwalbe ³ (<i>Sterna sandvicensis</i>) | Gelbbrauen-Laubsänger (<i>Phylloscopus inornatus</i>) |
| Rosaflamingo (<i>Phoenicopterus roseus</i>) | Rosenseeschwalbe (<i>Sterna dougalli</i>) | Dunkellaubsänger (<i>Phylloscopus fuscatus</i>) |
| Gleitaar (<i>Elanus caeruleus</i>) | Küstenseeschwalbe (<i>Sterna paradisaea</i>) | Zilpzal ⁴ (<i>Phylloscopus collybita</i> ; nur Unterart <i>tristis</i>) |
| Schmutzgeier (<i>Neophron percnopterus</i>) | Dickschnabellumme (<i>Uría lomvia</i>) | Halbringschnäpper (<i>Ficedula semitorquata</i>) |
| Mönchsgeier (<i>Aegypius monachus</i>) | Tordalk (<i>Alca torda</i>) | Lasurmeise (<i>Parus cyanus</i>) |
| Schlangenadler (<i>Circaetus gallicus</i>) | Trottellumme (<i>Uria aalge</i>) | Isabellwürger (<i>Lanius isabellinus</i>) |
| Steppenweihe (<i>Circus macrourus</i>) | Krabbentaucher (<i>Alle alle</i>) | Schwarzstirnwürger (<i>Lanius minor</i>) |
| Kurzfangsperber (<i>Accipiter brevipes</i>) | Papageitaucher (<i>Fratercula arctica</i>) | Raubwürger (<i>Lanius excubitor</i> ; alle Unterarten außer <i>excubitor</i>) |
| Adlerbussard (<i>Buteo rufinus</i>) | Steppenflughuhn (<i>Syrhaptes paradoxus</i>) | Rotkopfwürger (<i>Lanius senator</i>) |
| Schreiadler (<i>Aquila pomarina</i>) | Orienturteltaube (<i>Streptopelia orientalis</i>) | Alpendohle ⁶ (<i>Pyrrhocorax graculus</i>) |
| Schelladler (<i>Aquila clanga</i>) | Häherkuckuck (<i>Clamator glandarius</i>) | Alpenkrähe (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>) |
| Kaiseradler ⁶ (<i>Aquila heliaca</i>) | Schnee-Eule (<i>Bubo scandiacus</i>) | Rosenstar (<i>Pastor roseus</i>) |
| Steppenadler (<i>Aquila nipalensis</i>) | Sperbereule (<i>Sumia ulula</i>) | Steinsperling (<i>Petronia petronia</i>) |
| Zwergadler (<i>Aquila pennata</i>) | Blauracke ⁶ (<i>Coracias garrulus</i>) | Schneesperling ⁶ (<i>Montifringilla nivalis</i>) |
| Habichtsadler (<i>Aquila fasciata</i>) | Blauwangenspint (<i>Merops persicus</i>) | Zitronengirlitz ² (<i>Serinus citrinella</i>) |
| Rötelfalke (<i>Falco naumanni</i>) | Kalanderlerche (<i>Melanocorypha calandra</i>) | Berghänfling ¹ (<i>Carduelis flavirostris</i>) |
| Sakerfalke ⁶ (<i>Falco cherrug</i>) | Weißflügellere (<i>Melanocorypha leucoptera</i>) | Bindenkreuzschnabel (<i>Loxia leucoptera</i>) |
| Gerfalke (<i>Falco rusticolus</i>) | Mohrenlerche (<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>) | Kiefernkreuzschnabel (<i>Loxia pytyopsittacus</i>) |
| Zwergsumpfhuhn (<i>Porzana pusilla</i>) | Kurzzehenlerche (<i>Calandrella brachydactyla</i>) | Wüstengimpel (<i>Bucanetes githagineus</i>) |
| Purpurhuhn (<i>Porphyrio porphyrio</i>) | Stummellerche (<i>Calandrella rufescens</i>) | Hakengimpel (<i>Pinnicola enucleator</i>) |
| Zwergtrappe (<i>Tetrax tetrax</i>) | Ohrenlerche (<i>Eremophila alpestris</i>) | Spornammer (<i>Calcarius lapponicus</i>) |
| Steppenkranttrappe (<i>Chlamydotis macqueenii</i>) | Felsenschwalbe ⁶ (<i>Ptyonoprogne rupestris</i>) | Fichtenammer (<i>Emberiza leucocephalos</i>) |
| Rennvogel (<i>Cursorius cursor</i>) | Rötelschwalbe (<i>Cecropia daurica</i>) | Zaunammer ⁶ (<i>Emberiza cirius</i>) |
| Rotflügel-Brachschwalbe (<i>Glareola pratincola</i>) | Spornpieper (<i>Anthus richardi</i>) | Grauortolan (<i>Emberiza caesia</i>) |
| Schwarzflügel-Brachschwalbe (<i>Glareola nordmanni</i>) | Waldpieper (<i>Anthus hodgsoni</i>) | Waldammer (<i>Emberiza rustica</i>) |
| Seeregenpfeifer ^{1,3} (<i>Charadrius alexandrinus</i>) | Strandpieper (<i>Anthus petrosus</i>) | Zwergammer (<i>Emberiza pusilla</i>) |
| Wüstenregenpfeifer (<i>Charadrius leschenaultii</i>) | Schafstelze (<i>Motacilla flava</i> ; alle Unterarten außer <i>cinereocapilla</i> , <i>feldegg</i> , <i>flava</i> , <i>thunbergi</i>) | Kappenammer (<i>Emberiza melanocephala</i>) |
| Pazifischer Goldregenpfeifer (<i>Pluvialis fulva</i>) | Zitronenstelze (<i>Motacilla citreola</i>) | |
| Amerikanischer Goldregenpfeifer (<i>Pluvialis dominica</i>) | Bachstelze ⁴ (<i>Motacilla alba</i> ; alle Unterarten außer <i>alba</i>) | |
| Steppenkiebitz (<i>Vanellus gregarius</i>) | Bergbraunelle (<i>Prunella montanella</i>) | |
| Weißschwanzkiebitz (<i>Vanellus leucurus</i>) | Alpenbraunelle ⁶ (<i>Prunella collaris</i>) | |
| Weißbürzel-Strandläufer (<i>Calidris fuscicollis</i>) | Sprosser (<i>Luscinia luscinia</i>) | |
| Bairdstrandläufer (<i>Calidris bairdii</i>) | | |

Legende

¹ nur Feststellungen abseits des Neusiedler See/Seewinkel.

² wie oben, gilt aber nur für Frühjahrzug.

³ nur Feststellungen abseits des Bodenseegebietes.

⁴ nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung werden behandelt.

⁶ nur Feststellungen abseits der etablierten Brut- (siehe z.B. Dvorak et al., Atlas der Brutvögel Österreichs, 1993 bzw. Aufforderung zur Meldung nach Eingabe auf www.ornitho.at), Sommer-, Zug- und Winterverbreitungsgebiete.

⁷ nur sofern angenommen wird, dass es sich um Wildvögel und nicht um freigesetzte, entkommene bzw. verwilderte Vögel handelt. Neben der Beschreibung des Vogels sind vor allem die Beobachtungsumstände, die zu dieser Annahme führten, zu detaillieren.

Änderungen

Änderungen ab 19.11.2017: Nachweise der Weißwangengans, Zwergscharbe, Gänsegeier, Steinadler, Mornellregenpfeifer und Alpensegler werden künftig nicht mehr behandelt. Räumliche Überarbeitungen der Meldepflicht betreffen (in Klammer die Region, aus denen die Meldepflicht entfällt): Zwerggans (Neusiedler See-Gebiet), Kuhreiher (Neusiedler See- und Bodensee-Gebiet), Kaiseradler (Niederösterreich), Sakerfalke (Niederösterreich mit Ausnahme des Mostviertels), Zaunammer (Wachau und Wagram, rückwirkend ab 1.1.2017 nicht zu melden).

Änderungen ab 1.7.2016: Nachweise der Zwergscharbe aus dem gesamten Burgenland, sowie aus den steirischen Bezirken Südoststeiermark, Leibnitz, Hartberg-Fürstenfeld, Graz und Graz Umgebung werden künftig nicht mehr behandelt. Ebenfalls fällt die Protokollpflicht für Beobachtungen des Raufußbussards aus ganz Österreich.

Änderung ab 8.12.2012: Aufgrund neuer Erkenntnisse zur sicheren Bestimmung werden Nachweise aller Unterarten der Bachstelze (außer *alba*, insbesondere *yarrellii*) nur mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

Änderungen ab 1.1.2010: Für die folgenden Arten sind keine Dokumentationen an die AFK mehr erforderlich. Für alle diese Arten wird aber ersucht, die Beobachtungen via www.ornitho.at an BirdLife Österreich zu melden.

- Rostgans: Wildvögel können ohnedies nicht mehr gesichert nachgewiesen werden (außer über Ringfunde) und alle anderen Nachweise der Kategorien C und E werden nicht von der AFK gesammelt.
- Bartgeier: Wildvögel können im Alpenraum aufgrund des Wiedereinbürgerungsprogrammes nicht von Vögeln der Kategorie D/E bzw. zukünftig C getrennt werden. Es wird jedoch explizit ersucht alle Meldungen von Bartgeiern an das Monitoringprogramm (z.B. bartgeier@gmx.at) zu melden.
- Zwergohreule
- Habichtskauz: 2009 begonnenes Aussetzungsprogramm im Wienerwald und im Dürrensteingebiet; Vögel des Aussetzungsprogrammes aus dem Böhmerwald; etabliertes Brutvorkommen in Kärnten.
- Doppelschnepfen müssen im Frühjahr nur mehr abseits des Neusiedler See-Gebietes an die AFK gemeldet werden (alljährlicher Durchzügler im Frühjahr).
- Zwergseeschwalbe

Folgende Arten wurden in die Liste der zu meldenden Arten aufgenommen bzw. bisher geltende räumliche Einschränkungen gestrichen:

- Sichler: nunmehr auch aus dem Neusiedler See-Gebiet an die AFK melden.
- Mantelmöwe: nunmehr auch aus dem Bodenseegebiet an die AFK melden. Bei beiden Arten sind die entsprechenden Nachweise derart zurückgegangen, dass eine uneingeschränkte Aufnahme in die Liste der zu meldenden Arten erforderlich ist.
- Raufußbussard: neu abseits der etablierten Winterverbreitungsgebiete (NÖ und N-Burgenland) an die AFK melden. Eine Durchsicht der Nachweise dieser Art abseits des genannten Raumes zeigte die Seltenheit der Art und die mangelhafte Dokumentation über Belege (Fotos).
- Neu nachgewiesene Unterarten: Kormoran der atlantischen Unterart *carbo* sowie Tundramöwe (*Larus fuscus heuglini*). Von letzterer werden (so wie von der Unterart *tristis* des Zilpzalps) aufgrund der ausgesprochen schwierigen Bestimmung nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

Änderungen ab 29.11.2009: Zwergscharben müssen rückwirkend ab 2009 aus dem Neusiedler See-Gebiet nicht mehr an die AFK gemeldet werden (etablierter Brutvogel, Mauseergast, je nach Vereisung auch im Winter anwesend).

