

Welche seltenen Vogelarten sollen an die AFK gemeldet werden?

Which bird species should be reported to the AFK?



Herausgegeben von der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich, letzte Änderung 8.5.2026
Published by the Austrian Avifaunistic Committee (AFK) of BirdLife Austria, updated 8th May 2026

Legende

- ¹ nur Feststellungen abseits des Neusiedler See/Seewinkel.
- ² ausgenommen Beobachtungen am Frühjahrszug im Neusiedler See-Gebiet.
- ³ nur Feststellungen abseits des Bodenseegebietes.
- ⁴ nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung werden behandelt.
- ⁵ nur Nachweise ab dem 1. Juli.
- ⁶ nur Feststellungen abseits etablierter Brutgebiete (siehe z.B. Teufelbauer et al., Atlas der Brutvögel Österreichs, 2024), Sommer-, Zug- und Winterverbreitungsgebiete (bei Aufforderung nach Eingabe auf ornitho.at).
- ⁷ nur sofern angenommen wird, dass es sich um Wildvögel und nicht um freigesetzte, entkommene bzw. verwilderte Vögel handelt. Neben der Beschreibung des Vogels sind vor allem die Beobachtungsbedingungen, die zu dieser Annahme führten, zu detaillieren.
- ⁸ nur Feststellungen von Vögeln deren Herkunft gesichert ist (z.B. durch Beringung).
- ⁹ nur Feststellungen aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg.

Ringelgans (*Branta bernicla*)
 Rothalsgans^{1, 7} (*Branta ruficollis*)
 Waldsaatgans (*Anser fabalis*)
 Kurzschwanzgans (*Anser brachyrhynchus*)
 Blässgans (*Anser albifrons*; alle ssp. außer *albifrons*)
 Zwerggans¹ (*Anser erythropus*)
 Zwergschwan³ (*Cygnus columbianus*)
 Blauflügelente (*Spatula discors*)
 Sichelente (*Mareca falcata*)
 Nordamerikanische Pfeifente (*Mareca americana*)
 Amerikanische Krickente (*Anas carolinensis*)
 Ringschnabelente (*Aythya collaris*)
 Kragenente (*Histrionicus histrionicus*)
 Schwarzkopf-Ruderente (*Oxyura jamaicensis*)
 Weißkopf-Ruderente (*Oxyura leucocephala*)
 Steinhuhn⁸ (*Alectoris graeca*)
 Fahlsegler (*Apus pallidus*)
 Großtrappe⁹ (*Otis tarda*)
 Steppenkrägentrappe (*Chlamydotis macqueenii*)
 Zwergtrappe (*Tetrax tetrax*)
 Häherkuckuck (*Clamator glandarius*)
 Steppenflughuhn (*Syrhaptes paradoxus*)
 Orienturteltaube (*Streptopelia orientalis*)
 Purpurhuhn (*Porphyrio porphyrio*)
 Zwergsumpfhuhn (*Zapornia pusilla*)
 Jungfernkranich (*Grus virgo*)
 Rosaflamingo (*Phoenicopterus roseus*)
 Steppenkiebitz (*Vanellus gregarius*)
 Weißschwanzkiebitz (*Vanellus leucurus*)
 Pazifischer Goldregenpfeifer (*Pluvialis fulva*)
 Amerikanischer Goldregenpfeifer (*Pluvialis dominica*)
 Seeregenschwanzpfeifer^{1,3} (*Charadrius alexandrinus*)
 Wüstenregenpfeifer (*Charadrius leschenaultii*)
 Dünnschwanz-Brachvogel (*Numenius tenuirostris*)
 Uferschnepfe (*Limosa limosa*; alle Unterarten außer *limosa*)
 Sumpfläufer¹ (*Calidris falcinellus*)
 Weißbürzel-Strandläufer (*Calidris fuscicollis*)
 Grasläufer (*Calidris subruficollis*)
 Bairdstrandläufer (*Calidris bairdii*)
 Graubrust-Strandläufer (*Calidris melanotos*)
 Sandstrandläufer (*Calidris pusilla*)
 Meerstrandläufer (*Calidris maritima*)
 Spitzschwanz-Strandläufer (*Calidris acuminata*)
 Doppelschnepfe² (*Gallinago media*)
 Terekwasserrläufer (*Xenus cinereus*)
 Thorshühnchen (*Phalaropus fulicarius*)
 Drosseluferläufer (*Actitis macularia*)
 Kleiner Gelbschenkel (*Tringa flavipes*)
 Rennvogel (*Cursorius cursor*)
 Rotflügel-Brachschwalbe (*Glareola pratincta*)
 Schwarzflügel-Brachschwalbe (*Glareola nordmanni*)
 Dünnschwanzmöhwe (*Chroicocephalus genei*)
 Bonapartemöhwe (*Chroicocephalus philadelphia*)
 Präriemöhwe (*Leucophaea pipixcan*)
 Fischmöhwe (*Ichthyophaga ichthyophaga*)
 Korallenmöhwe (*Ichthyophaga audouinii*)
 Sturmmöhwe (*Larus canus*; nur Unterart *heinei*)
 Ringschnabelmöhwe (*Larus delawarensis*)
 Mantelmöhwe (*Larus marinus*)
 Eismöhwe (*Larus hyperboreus*)
 Polarmöhwe (*Larus glaucoideus*)
 Heringsmöhwe (*Larus fuscus*; nur Unterarten *graellsii*⁸ und *heuglinii*⁸)

Dreizehenmöhwe (*Rissa tridactyla*)
 Schwalbenmöhwe (*Xema sabini*)
 Lachseeschwalbe (*Gelochelidon nilotica*)
 Rüppellseeschwalbe (*Thalasseus bengalensis*)
 Rosenseeschwalbe (*Sterna dougalli*)
 Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*)
 Skua (*Stercorarius skua*)
 Spatelraumbmöhwe (*Stercorarius pomarinus*)
 Schmarotzeraumbmöhwe (*Stercorarius parasiticus*)
 Falkenraumbmöhwe (*Stercorarius longicaudus*)
 Krabbentaucher (*Alle alle*)
 Dickschnabellumme (*Uria lomvia*)
 Trottellumme (*Uria aalge*)
 Tordalk (*Alca torda*)
 Papageitaucher (*Fratercula arctica*)
 Eistaucher (*Gavia immer*)
 Gelbschnabeltaucher (*Gavia adamsii*)
 Sturmwellenläufer (*Hydrobates pelagicus*)
 Wellenläufer (*Hydrobates leucorhous*)
 Sepiasturmtaucher (*Calonectris diomedea*)
 Mittelmeer-Sturmtaucher (*Puffinus yelkouan*)
 Basstölpel (*Morus bassanus*)
 Krähenscharbe (*Gulosus aristotelis*)
 Heiliger Ibis⁷ (*Threskiornis aethiopicus*)
 Sichler (*Plegadis falcinellus*)
 Rosapelikan (*Pelecanus onocrotalus*)
 Krauskopfpelikan (*Pelecanus crispus*)
 Gleitaar (*Elanus caeruleus*)
 Schmutzgeier (*Neophron percnopterus*)
 Mönchsgeier (*Aegypius monachus*)
 Schreiadler (*Clanga pomarina*)
 Schelladler (*Clanga clanga*)
 Zwergadler (*Aquila pennata*)
 Steppenadler (*Aquila nipalensis*)
 Kaiseradler⁸ (*Aquila heliaca*)
 Habichtsadler (*Aquila fasciata*)
 Kurzfangsperber (*Accipiter brevipes*)
 Sperebule (*Sumia ulula*)
 Schneeeule (*Bubo scandiacus*)
 Blauracke⁸ (*Coracias garrulus*)
 Blauwangenspint (*Merops persicus*)
 Rötelfalke (*Falco naumanni*)
 Eleonorenfalke (*Falco eleonorae*)
 Sakerfalke⁸ (*Falco cherrug*)
 Wanderfalke (*Falco peregrinus*; alle Unterarten außer *peregrinus* und *calidus*)
 Gerfalke (*Falco rusticolus*)
 Isabellwürger (*Lanius isabellinus*)
 Schwarzstirnwürger⁸ (*Lanius minor*)
 Raubwürger (*Lanius excubitor*; alle Unterarten außer *excubitor*)
 Rotkopfwürger (*Lanius senator*)
 Alpenkrähe (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)
 Alpendohle⁸ (*Pyrrhocorax graculus*)
 Lasurmeise (*Cyanistes cyanus*)
 Weißflügellerche (*Alauda leucoptera*)
 Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*)
 Kurzzehenlerche (*Calandrella brachydactyla*)
 Bergkalanderlerche (*Melanocorypha bimaculata*)
 Kalanderlerche (*Melanocorypha calandra*)
 Schwarzsteppenlerche (*Melanocorypha yeltoniensis*)
 Turkestanlerche (*Alauda heinei*)
 Rötelschwalbe (*Cecropis daurica*)

Seidensänger (*Cettia cetti*)
 Tienschan-Laubsänger (*Phylloscopus humei*)
 Gelbbrauen-Laubsänger (*Phylloscopus inornatus*)
 Goldhähnchen-Laubsänger (*Phylloscopus proregulus*)
 Dunkellaubsänger (*Phylloscopus fuscatus*)
 Zilpzalp⁴ (*Phylloscopus collybita*; nur Unterart *tristis*)
 Iberienzilpzalp (*Phylloscopus iberiae*)
 Grünlaubsänger (*Phylloscopus trochiloides*)
 Mariskenrohrsänger⁸ (*Acrocephalus melanopogon*)
 Seggenrohrsänger (*Acrocephalus paludicola*)
 Feldrohrsänger (*Acrocephalus agricola*)
 Buschrohrsänger (*Acrocephalus dumetorum*)
 Buschspötter (*Iduna aurea*)
 Blassspötter (*Iduna pallida*)
 Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)
 Zistensänger (*Cisticola juncidis*)
 Orpheusgrasmücke (*Curruca hortensis*)
 Wüstengrasmücke (*Curruca nana*)
 Samtkopf-Grasmücke (*Curruca melanocephala*)
 Balkan-Bartgrasmücke (*Curruca cantillans*)
 Rosenstar⁸ (*Pastor roseus*)
 Erddrossel (*Zoothera aurea*)
 Schwarzkehldrossel (*Turdus atrogularis*)
 Rostflügelrossel (*Turdus eunomus*)
 Rostschwanzdrossel (*Turdus naumanni*)
 Wanderdrossel (*Turdus migratorius*)
 Sprosser (*Luscinia luscinia*)
 Halbringschnäpper (*Ficedula semitorquata*)
 Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*; alle Unterarten außer *gibraltariensis*)
 Steinrötel⁸ (*Monticola saxatilis*)
 Blaumerle (*Monticola solitarius*)
 Sibirisches Schwarzkehlchen (*Saxicola maurus*)
 Isabellsteinschmätzer (*Oenanthe isabellina*)
 Wüstensteinschmätzer (*Oenanthe deserti*)
 Nonnensteinschmätzer (*Oenanthe pleschanka*)
 Balkansteinschmätzer (*Oenanthe melanoleuca*)
 Steinsperling (*Petronia petronia*)
 Schneesperling⁸ (*Montifringilla nivalis*)
 Bergbraunelle (*Prunella montanella*)
 Schafstelze (*Motacilla flava*; alle Unterarten außer *cinereo-capilla*, *feldegg*, *flava*, *thunbergi*)
 Zitronenstelze⁸ (*Motacilla citreola*)
 Bachstelze⁴ (*Motacilla alba*; alle Unterarten außer *alba*)
 Spornpieper (*Anthus richardi*)
 Waldpieper (*Anthus hodgsoni*)
 Strandpieper (*Anthus petrosus*)
 Hakengimpel (*Pinicola enucleator*)
 Wüstengimpel (*Bucanetes githagineus*)
 Berghänfling¹ (*Carduelis flavirostris*)
 Polarbirkenzeisig (*Carduelis homemanni*)
 Kiefernkreuzschnabel (*Loxia pytyopsittacus*)
 Bindenkreuzschnabel (*Loxia leucoptera*)
 Zitronenzeisig⁸ (*Serinus citrinella*)
 Spornammer (*Calcarius lapponicus*)
 Fichtenammer (*Emberiza leucocephalos*)
 Zaunammer⁸ (*Emberiza cirius*)
 Grauertolan (*Emberiza caesia*)
 Zwergammer (*Emberiza pusilla*)
 Waldammer (*Emberiza rustica*)
 Rötellammer (*Emberiza rutila*)
 Kappenammer (*Emberiza melanocephala*)

Änderungen in dieser Liste (chronologisch)

Ab 1.1.2026:

Nachweise des Schlangenadlers sind österreichweit nicht mehr an die AFK zu melden. Für den Zitronenzeisig entfällt die Meldepflicht aus dem Dachsteingebiet (Steiermark/Salzburg).

Ab 1.1.2023:

Schwarzstirnwürger sind nur noch abseits etablierter Brutgebiete (Seewinkel, Parndorfer Platte) zu melden.

Ab 1.1.2022:

Kuhreihner und Kormorane der ssp. *carbo* werden von der Dokumentationspflicht gestrichen. Parallel zur neuen „Artenliste der Vögel Österreichs“ (Dez. 2021) wurde auch die Taxonomie dieser Liste angepasst und folgt nun der „World Bird List“ in der Fassung 11.2 des IOC (Gill et al. 2021). Nachweise des Kaiseradlers sind nur noch aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg zu melden.

Ab 1.1.2021: Nachweise der Unterart *graellsii* der Heringsmöwe sind künftig zu melden. Adlerbussard, Steppenweihe und Brandseeschwalbe werden von der Dokumentationspflicht gestrichen. Für Zitronenstelze und Rosenstar sind nur Meldungen in der zweiten Jahreshälfte ab 1.7. dokumentationspflichtig. Die Waldsaatgans wird neu in die Liste der dokumentationspflichtigen Arten aufgenommen.

Ab 1.1.2020: Nachweise von Felsenschwalbe und Alpenbraunelle werden österreichweit nicht mehr und solche des Kaiseradlers auch aus den oberösterreichischen Bezirken Perg, Linz, Linz-Land, Steyr und Steyr-Land nicht mehr behandelt. Nachweise der Großtrappe abseits des Brutgebietes bzw. des regelmäßigen Aktionsraumes sind künftig an die AFK zu melden.

Ab 1.1.2019: Nachweise der Zaunammer aus Niederösterreich und Wien werden nicht mehr behandelt.

Ab 19.11.2017: Nachweise der Weißwangengans, Zwergscharbe, Gänsegeier, Steinadler, Mornellregenfeifer und Alpensegler werden künftig nicht mehr behandelt. Räumliche Überarbeitungen der Meldepflicht betreffen (in Klammer die Region, aus denen die Meldepflicht entfällt): Zwerggans (Neusiedler See-Gebiet), Kuhreihner (Neusiedler See- und Bodensee-Gebiet), Kaiseradler (Niederösterreich), Sakerfalke (Niederösterreich mit Ausnahme des Mostviertels), Zaunammer (Wachau und Wagram, rückwirkend ab 1.1.2017 nicht zu melden).

Ab 1.7.2016: Nachweise der Zwergscharbe aus dem gesamten Burgenland, sowie aus den steirischen Bezirken Südoststeiermark, Leibnitz, Hartberg-Fürstenfeld, Graz und Graz Umgebung werden künftig nicht mehr behandelt. Ebenfalls fällt die Protokollpflicht für Beobachtungen des Raufußbussards aus ganz Österreich.

Ab 8.12.2012: Aufgrund neuer Erkenntnisse zur sicheren Bestimmung werden Nachweise aller Unterarten der Bachstelze (außer *alba*, insbesondere *yarrellii*) nur mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

Ab 1.1.2010: Für die folgenden Arten ist keine Dokumentation an die AFK mehr erforderlich. Für alle diese Arten wird aber ersucht, die Beobachtungen via www.ornitho.at an BirdLife Österreich zu melden. Rostgans: Wildvögel können nicht mehr gesichert nachgewiesen werden (außer über Ringfunde) und alle anderen Nachweise der Kategorien C und E werden nicht von der AFK gesammelt. Bartgeier: Wildvögel können im Alpenraum aufgrund des Wiedereinbürgerungsprogrammes nicht von Vögeln der Kategorie D/E bzw. zukünftig C getrennt werden. Es wird jedoch explizit ersucht alle Meldungen von Bartgeiern auf www.ornitho.at zu melden. Zwergohreule. Habichtskauz: 2009 begonnenes Aussetzungsprogramm im Wienerwald und im Dürrensteingebiet; Vögel des Aussetzungsprogrammes aus dem Böhmerwald; etabliertes Brutvorkommen in Kärnten. Doppelschnepfen müssen im Frühjahr nur mehr abseits des Neusiedler See-Gebietes an die AFK gemeldet werden (alljährlicher Durchzügler im Frühjahr). Zwergseeschwalbe. Folgende Arten wurden in die Liste der zu meldenden Arten aufgenommen bzw. bisher geltende räumliche Einschränkungen gestrichen: Sichter: nunmehr auch aus dem Neusiedler See-Gebiet an die AFK melden. Mantelmöwe: nunmehr auch aus dem Bodenseegebiet an die AFK melden. Bei beiden Arten sind die entsprechenden Nachweise derart zurückgegangen, dass eine uneingeschränkte Aufnahme in die Liste der zu meldenden Arten erforderlich ist. Raufußbussard: neu abseits der etablierten Winterverbreitungsgebiete (NÖ und N-Burgenland) an die AFK melden. Eine Durchsicht der Nachweise dieser Art abseits des genannten Raumes zeigte die Seltenheit der Art und die mangelhafte Dokumentation über Belege (Fotos). Neu nachgewiesene Unterarten: Kormoran der atlantischen Unterart *carbo* sowie Tundramöwe (*Larus fuscus heuglini*). Von letzterer werden (so wie von der Unterart *tristis* des Zilpzalps) aufgrund der ausgesprochen schwierigen Bestimmung nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

Ab 29.11.2009: Zwergscharben müssen rückwirkend ab 2009 aus dem Neusiedler See-Gebiet nicht mehr an die AFK gemeldet werden (etablierter Brutvogel, Mauseergast, je nach Vereinsung auch im Winter anwesend).

