

# Welche Seltenheiten sollen an die AFK gemeldet werden?

## Which species should be reported to the AFK?

Letzte Änderung/updated: 6.5.2020

Herausgegeben von der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich ([www.birdlife-afk.at](http://www.birdlife-afk.at))  
Published by the Austrian Avifaunistic Committee (AFK) of BirdLife Austria



Eine Legende der Einschränkungen der Meldepflicht (Kennzeichnung durch hochgestellte Ziffern) und die zuletzt vorgenommenen Änderungen der Liste finden sich auf Seite 2 dieses Dokuments.

Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, wenn Arten nach Revisionen von der österreichischen Artenliste gestrichen wurden oder durch anerkannte Erstnachweise neue Arten hinzugekommen sind. Außerdem erfolgen Aktualisierungen, um systematische und taxonomische Änderungen in der österreichischen Artenliste zu übernehmen. Die folgende Liste jener Arten bzw. Unterarten, die an die Avifaunistische Kommission (mittels des Online-Meldeformulars auf [birdlife-afk.at](http://birdlife-afk.at)) gemeldet werden sollen, enthält nur Arten, die bisher als Wildvögel oder aus verwilderten Populationen stammend in Österreich nachgewiesen worden sind. Zusätzlich sind Beobachtungen von Arten oder Unterarten, die bisher noch nicht in Österreich als Wildvogel festgestellt worden sind und bei denen ein Auftreten als Wildvogel vermutet wird an die AFK zu melden.

Zwergschwan <sup>3</sup> ( <i>Cygnus columbianus</i> )	Bairdstrandläufer ( <i>Calidris bairdii</i> )	Sibirisches Schwarzkehlchen ( <i>Saxicola maurus</i> )
Kurzschabelgans ( <i>Anser brachyrhynchus</i> )	Graubrust-Strandläufer ( <i>Calidris melanotos</i> )	Isabellsteinschmätzer ( <i>Oenanthe isabellina</i> )
Blässgans ( <i>Anser albifrons</i> ; alle ssp. außer <i>albifrons</i> )	Sandstrandläufer ( <i>Calidris pusilla</i> )	Nonnensteinschmätzer ( <i>Oenanthe pleschanka</i> )
Zwerggans <sup>1</sup> ( <i>Anser erythropus</i> )	Spitzschwanz-Strandläufer ( <i>Calidris acuminata</i> )	Mittelmeer-Steinschmätzer ( <i>Oenanthe hispanica</i> )
Ringelgans ( <i>Branta bernicla</i> )	Meerstrandläufer ( <i>Calidris maritima</i> )	Wüstensteinschmätzer ( <i>Oenanthe deserti</i> )
Rothalsgans <sup>1,7</sup> ( <i>Branta ruficollis</i> )	Sumpfläufer <sup>1</sup> ( <i>Limicola falcinellus</i> )	Steinrötel <sup>6</sup> ( <i>Monticola saxatilis</i> )
Nordamerikanische Pfeifente ( <i>Anas americana</i> )	Grasläufer ( <i>Tryngites subruficollis</i> )	Blaumerle ( <i>Monticola solitarius</i> )
Sichelente ( <i>Anas falcata</i> )	Doppelschnepfe <sup>2</sup> ( <i>Gallinago media</i> )	Erddrossel ( <i>Zoothera dauma</i> )
Amerikanische Krickente ( <i>Anas carolinensis</i> )	Dünnschnabel-Brachvogel ( <i>Numenius tenuirostris</i> )	Rostschwanzdrossel ( <i>Turdus naumanni</i> )
Blaufügelente ( <i>Anas discors</i> )	Terekwasserläufer ( <i>Xenus cinereus</i> )	Rostflügeldrossel ( <i>Turdus eunomus</i> )
Ringschnabelente ( <i>Aythya collaris</i> )	Drosselufelrläufer ( <i>Actitis macularius</i> )	Schwarzkehlrossel ( <i>Turdus atrogularis</i> )
Kragente ( <i>Histrionicus histrionicus</i> )	Kleiner Gelbschenkel ( <i>Tringa flavipes</i> )	Wanderdrossel ( <i>Turdus migratorius</i> )
Schwarzkopf-Ruderente ( <i>Oxyura jamaicensis</i> )	Thorshühnchen ( <i>Phalaropus fulicarius</i> )	Seidensänger ( <i>Cettia cetti</i> )
Weißkopf-Ruderente ( <i>Oxyura leucocephala</i> )	Spatelraubmöwe ( <i>Stercorarius pomarinus</i> )	Cistensänger ( <i>Cisticola juncidis</i> )
Steinhuhn <sup>6</sup> ( <i>Alectoris graeca</i> )	Schmarotzerraubmöwe ( <i>Stercorarius parasiticus</i> )	Buschspötter ( <i>Iduna caligata</i> )
Eistaucher ( <i>Gavia immer</i> )	Falkenraubmöwe ( <i>Stercorarius longicaudus</i> )	Blassspötter ( <i>Iduna pallida</i> )
Gelbschnabeltaucher ( <i>Gavia adamsii</i> )	Skua ( <i>Stercorarius skua</i> )	Orpheusspötter ( <i>Hippolais polyglotta</i> )
Sepiasturmtaucher ( <i>Calonectris diomedea</i> )	Fischmöwe ( <i>Larus ichthyaetus</i> )	Mariskensänger <sup>6</sup> ( <i>Acrocephalus melanopogon</i> )
Mittelmeer-Sturmtaucher ( <i>Puffinus yelkouan</i> )	Dünnschnabelmöwe ( <i>Larus genei</i> )	Seggenrohrsänger ( <i>Acrocephalus paludicola</i> )
Sturmschwalbe ( <i>Hydrobates pelagicus</i> )	Ringschnabelmöwe ( <i>Larus delawarensis</i> )	Feldrohrsänger ( <i>Acrocephalus agricola</i> )
Wellenläufer ( <i>Oceanodroma leucorhoa</i> )	Tundramöwe <sup>4</sup> ( <i>Larus fuscus heuglini</i> )	Buschrohrsänger ( <i>Acrocephalus dumetorum</i> )
Basstölpel ( <i>Morus bassanus</i> )	Polarmöwe ( <i>Larus glaucooides</i> )	Weißbart-Grasmücke ( <i>Sylvia cantillans</i> )
Kormoran ( <i>Phalacrocorax carbo</i> ; nur Unterart <i>carbo</i> )	Eismöwe ( <i>Larus hyperboreus</i> )	Samtkopf-Grasmücke ( <i>Sylvia melanocephala</i> )
Krähenscharbe ( <i>Phalacrocorax aristotelis</i> )	Mantelmöwe ( <i>Larus marinus</i> )	Orpheusgrasmücke ( <i>Sylvia hortensis</i> )
Rosapelikan ( <i>Pelecanus onocrotalus</i> )	Dreizehenmöwe ( <i>Rissa tridactyla</i> )	Grünlaubsänger ( <i>Phylloscopus trochiloides</i> )
Krauskopfpelikan ( <i>Pelecanus crispus</i> )	Schwalbenmöwe ( <i>Xema sabini</i> )	Goldhähnchen-Laubsänger ( <i>Phylloscopus proregulus</i> )
Kuhreiher <sup>1,3</sup> ( <i>Bubulcus ibis</i> )	Lachseeschwalbe ( <i>Gelochelidon nilotica</i> )	Gelbbrauen-Laubsänger ( <i>Phylloscopus inornatus</i> )
Sichler ( <i>Plegadis falcinellus</i> )	Rüppellseeschwalbe ( <i>Sterna bengalensis</i> )	Dunkellaubsänger ( <i>Phylloscopus fuscatus</i> )
Rosaflamingo ( <i>Phoenicopterus roseus</i> )	Brandseeschwalbe <sup>3</sup> ( <i>Sterna sandvicensis</i> )	Zilpzalp <sup>6</sup> ( <i>Phylloscopus collybita</i> ; nur Unterart <i>tristis</i> )
Gleitaar ( <i>Elanus caeruleus</i> )	Rosenseeschwalbe ( <i>Sterna dougalli</i> )	Halbringschnäpper ( <i>Ficedula semitorquata</i> )
Schmutzgeier ( <i>Neophron percnopterus</i> )	Küstenseeschwalbe ( <i>Sterna paradisaea</i> )	Lasurmeise ( <i>Parus cyanus</i> )
Mönchsgeier ( <i>Aegypius monachus</i> )	Dickschnabellumme ( <i>Uria lomvia</i> )	Isabellwürger ( <i>Lanius isabellinus</i> )
Schlangenadler ( <i>Circaetus gallicus</i> )	Tordalk ( <i>Alca torda</i> )	Schwarzstirnwürger ( <i>Lanius minor</i> )
Steppenweihe ( <i>Circus macrourus</i> )	Trottellumme ( <i>Uria aalge</i> )	Raubwürger ( <i>Lanius excubitor</i> , alle Unterarten außer <i>excubitor</i> )
Kurzfangsperber ( <i>Accipiter brevipes</i> )	Krabentaucher ( <i>Alle alle</i> )	Rotkopfwürger ( <i>Lanius senator</i> )
Adlerbussard ( <i>Buteo rufinus</i> )	Papageitauer ( <i>Fratercula arctica</i> )	Alpendohle <sup>6</sup> ( <i>Pyrrhocorax graculus</i> )
Schreiadler ( <i>Aquila pomarina</i> )	Steppenflughuhn ( <i>Syrhaptes paradoxus</i> )	Alpenkrähe ( <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> )
Schelladler ( <i>Aquila clanga</i> )	Orienturteltaube ( <i>Streptopelia orientalis</i> )	Rosenstar ( <i>Pastor roseus</i> )
Kaiseradler <sup>6</sup> ( <i>Aquila heliaca</i> )	Häherkuckuck ( <i>Clamator glandarius</i> )	Steinsperling ( <i>Petronia petronia</i> )
Steppenadler ( <i>Aquila nipalensis</i> )	Schnee-Eule ( <i>Bubo scandiacus</i> )	Schneesperling <sup>6</sup> ( <i>Montifringilla nivalis</i> )
Zwergadler ( <i>Aquila pennata</i> )	Sperberule ( <i>Sumia ulula</i> )	Zitronengirlitz <sup>6</sup> ( <i>Serinus citrinella</i> )
Habichtsadler ( <i>Aquila fasciata</i> )	Blauracke <sup>6</sup> ( <i>Coracias garrulus</i> )	Berghänfling <sup>1</sup> ( <i>Carduelis flavirostris</i> )
Rötelfalke ( <i>Falco naumanni</i> )	Blauwangenspint ( <i>Merops persicus</i> )	Bindenkreuzschnabel ( <i>Loxia leucoptera</i> )
Sakerfalke <sup>6</sup> ( <i>Falco cherrug</i> )	Kalanderlerche ( <i>Melanocorypha calandra</i> )	Kiefernkreuzschnabel ( <i>Loxia pytyopsittacus</i> )
Gerfalke ( <i>Falco rusticolus</i> )	Weißflügellerche ( <i>Melanocorypha leucoptera</i> )	Wüstengimpel ( <i>Bucanetes githagineus</i> )
Zwergsumpfhuhn ( <i>Porzana pusilla</i> )	Mohrenlerche ( <i>Melanocorypha yeltoniensis</i> )	Hakengimpel ( <i>Pinicola enucleator</i> )
Purpurhuhn ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )	Kurzzeilenlerche ( <i>Calandrella brachydactyla</i> )	Spornammer ( <i>Calcarius lapponicus</i> )
Zwergtrappe ( <i>Tetrax tetrax</i> )	Stummellerche ( <i>Calandrella rufescens</i> )	Fichtenammer ( <i>Emberiza leucocephalos</i> )
Großtrappe <sup>6</sup> ( <i>Otis tarda</i> )	Ohrenlerche ( <i>Eremophila alpestris</i> )	Zaunammer <sup>6</sup> ( <i>Emberiza cirius</i> )
Steppenkrägentrappe ( <i>Chlamydotis macqueenii</i> )	Rötelschwalbe ( <i>Cecropis daurica</i> )	Grauertolan ( <i>Emberiza caesia</i> )
Rennvogel ( <i>Cursorius cursor</i> )	Spornpieper ( <i>Anthus richardi</i> )	Waldammer ( <i>Emberiza rustica</i> )
Rotflügel-Brachschwalbe ( <i>Glareola pratincola</i> )	Waldpieper ( <i>Anthus hodgsoni</i> )	Zwergammer ( <i>Emberiza pusilla</i> )
Schwarzflügel-Brachschwalbe ( <i>Glareola nordmanni</i> )	Strandpieper ( <i>Anthus petrosus</i> )	Kappenammer ( <i>Emberiza melanocephala</i> )
Seeregenpfeifer <sup>1,3</sup> ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	Schafstelze ( <i>Motacilla flava</i> ; alle Unterarten außer <i>cinereocapilla</i> , <i>feldegg</i> , <i>flava</i> , <i>thunbergi</i> )	
Wüstenregenpfeifer ( <i>Charadrius leschenaultii</i> )	Zitronenstelze ( <i>Motacilla citreola</i> )	
Pazifischer Goldregenpfeifer ( <i>Pluvialis fulva</i> )	Bachstelze <sup>4</sup> ( <i>Motacilla alba</i> ; alle Unterarten außer <i>alba</i> )	
Amerikanischer Goldregenpfeifer ( <i>Pluvialis dominica</i> )	Bergbraunelle ( <i>Prunella montanella</i> )	
Steppenkiebitz ( <i>Vanellus gregarius</i> )	Sprosser ( <i>Luscinia luscinia</i> )	
Weißschwanzkiebitz ( <i>Vanellus leucurus</i> )	Hausrotschwanz ( <i>Phoenicurus ochruros</i> ; alle Unterarten außer <i>gibraltariensis</i> )	
Weißbürrzel-Strandläufer ( <i>Calidris fuscicollis</i> )		

## Legende

<sup>1</sup> nur Feststellungen abseits des Neusiedler See/Seewinkel.

<sup>2</sup> wie oben, gilt aber nur für Frühjahrszug.

<sup>3</sup> nur Feststellungen abseits des Bodenseegebietes.

<sup>4</sup> nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung werden behandelt.

<sup>6</sup> nur Feststellungen abseits der etablierten Brut- (siehe z.B. Dvorak et al., Atlas der Brutvögel Österreichs, 1993 bzw. Aufforderung zur Meldung nach Eingabe auf [www.ornitho.at](http://www.ornitho.at)), Sommer-, Zug- und Winterverbreitungsgebiete.

<sup>7</sup> nur sofern angenommen wird, dass es sich um Wildvögel und nicht um freigesetzte, entkommene bzw. verwilderte Vögel handelt. Neben der Beschreibung des Vogels sind vor allem die Beobachtungsumstände, die zu dieser Annahme führten, zu detaillieren.

## Änderungen

Ab 1.1.2020: Nachweise von Felsenschwalbe und Alpenbraunelle werden österreichweit nicht mehr und solche des Kaiseradlers auch aus den Bezirken Perg, Linz, Linz-Land, Steyr und Steyr-Land nicht mehr behandelt.

Nachweise der Großstrappe abseits des Brutgebietes bzw. des regelmäßigen Aktionsraumes sind künftig an die AFK zu melden.

Ab 1.1.2019: Nachweise der Zaunammer aus Niederösterreich und Wien werden nicht mehr behandelt.

Änderungen ab 19.11.2017: Nachweise der Weißwangengans, Zwergscharbe, Gänsegeier, Steinadler, Mornellregenpfeifer und Alpengler werden künftig nicht mehr behandelt. Räumliche Überarbeitungen der Meldepflicht betreffen (in Klammer die Region, aus denen die Meldepflicht entfällt): Zwerggans (Neusiedler See-Gebiet), Kuhreiher (Neusiedler See- und Bodensee-Gebiet), Kaiseradler (Niederösterreich), Sakerfalke (Niederösterreich mit Ausnahme des Mostviertels), Zaunammer (Wachau und Wagram, rückwirkend ab 1.1.2017 nicht zu melden).

Änderungen ab 1.7.2016: Nachweise der Zwergscharbe aus dem gesamten Burgenland, sowie aus den steirischen Bezirken Südoststeiermark, Leibnitz, Hartberg-Fürstenfeld, Graz und Graz Umgebung werden künftig nicht mehr behandelt. Ebenfalls fällt die Protokollpflicht für Beobachtungen des Raufußbussards aus ganz Österreich.

Änderung ab 8.12.2012: Aufgrund neuer Erkenntnisse zur sicheren Bestimmung werden Nachweise aller Unterarten der Bachstelze (außer *alba*, insbesondere *yarrellii*) nur mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

Änderungen ab 1.1.2010: Für die folgenden Arten sind keine Dokumentationen an die AFK mehr erforderlich. Für alle diese Arten wird aber ersucht, die Beobachtungen via [www.ornitho.at](http://www.ornitho.at) an BirdLife Österreich zu melden.

- Rostgans: Wildvögel können ohnedies nicht mehr gesichert nachgewiesen werden (außer über Ringfunde) und alle anderen Nachweise der Kategorien C und E werden nicht von der AFK gesammelt.
- Bartgeier: Wildvögel können im Alpenraum aufgrund des Wiedereinbürgerungsprogrammes nicht von Vögeln der Kategorie D/E bzw. zukünftig C getrennt werden. Es wird jedoch explizit ersucht alle Meldungen von Bartgeiern an das Monitoringprogramm (z.B. [bartgeier@gmx.at](mailto:bartgeier@gmx.at)) zu melden.
- Zwergohreule
- Habichtskauz: 2009 begonnenes Aussetzungsprogramm im Wienerwald und im Dürrensteingebiet; Vögel des Aussetzungsprogrammes aus dem Böhmerwald; etabliertes Brutvorkommen in Kärnten.
- Doppelschnepfen müssen im Frühjahr nur mehr abseits des Neusiedler See-Gebietes an die AFK gemeldet werden (alljährlicher Durchzügler im Frühjahr).
- Zwergseeschwalbe

Folgende Arten wurden in die Liste der zu meldenden Arten aufgenommen bzw. bisher geltende räumliche Einschränkungen gestrichen:

- Sichler: nunmehr auch aus dem Neusiedler See-Gebiet an die AFK melden.
- Mantelmöwe: nunmehr auch aus dem Bodenseegebiet an die AFK melden. Bei beiden Arten sind die entsprechenden Nachweise derart zurückgegangen, dass eine uneingeschränkte Aufnahme in die Liste der zu meldenden Arten erforderlich ist.
- Raufußbussard: neu abseits der etablierten Winterverbreitungsgebiete (NÖ und N-Burgenland) an die AFK melden. Eine Durchsicht der Nachweise dieser Art abseits des genannten Raumes zeigte die Seltenheit der Art und die mangelhafte Dokumentation über Belege (Fotos).
- Neu nachgewiesene Unterarten: Kormoran der atlantischen Unterart *carbo* sowie Tundramöwe (*Larus fuscus heuglini*). Von letzterer werden (so wie von der Unterart *tristis* des Zilpzalps) aufgrund der ausgesprochen schwierigen Bestimmung nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

Änderungen ab 29.11.2009: Zwergscharben müssen rückwirkend ab 2009 aus dem Neusiedler See-Gebiet nicht mehr an die AFK gemeldet werden (etablierter Brutvogel, Mausegast, je nach Vereisung auch im Winter anwesend).

