

# Welche Seltenheiten sollen an die AFK gemeldet werden?

## Which species should be reported to the AFK?



Letzte Änderung/updated: 11.1.2021

Herausgegeben von der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich ([www.birdlife-afk.at](http://www.birdlife-afk.at))  
Published by the Austrian Avifaunistic Committee (AFK) of BirdLife Austria

Eine Legende der Einschränkungen der Meldepflicht (Kennzeichnung durch hochgestellte Ziffern) und die zuletzt vorgenommenen Änderungen der Liste finden sich auf Seite 2 dieses Dokuments.

Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, wenn Arten nach Revisionen von der österreichischen Artenliste gestrichen wurden oder durch anerkannte Erstnachweise neue Arten hinzugekommen sind. Außerdem erfolgen Aktualisierungen, um systematische und taxonomische Änderungen in der österreichischen Artenliste zu übernehmen. Die folgende Liste jener Arten bzw. Unterarten, die an die Avifaunistische Kommission (mittels des Online-Meldeformulars auf [birdlife-afk.at](http://birdlife-afk.at)) gemeldet werden sollen, enthält nur Arten, die bisher als Wildvögel oder aus verwilderten Populationen stammend in Österreich nachgewiesen worden sind. Zusätzlich sind Beobachtungen von Arten oder Unterarten, die bisher noch nicht in Österreich als Wildvogel festgestellt worden sind und bei denen ein Auftreten als Wildvogel vermutet wird an die AFK zu melden.

Zwergschwan <sup>3</sup> ( <i>Cygnus columbianus</i> )	Weißschwanzkiebitz ( <i>Vanellus leucurus</i> )	Sprosser ( <i>Luscinia luscinia</i> )
Kurzschwanzgans ( <i>Anser brachyrhynchus</i> )	Weißbürzel-Strandläufer ( <i>Calidris fuscicollis</i> )	Hausrotschwanz ( <i>Phoenicurus ochruros</i> ; alle Unterarten außer <i>gibraltariensis</i> )
Blässgans ( <i>Anser albifrons</i> ; alle ssp. außer <i>albifrons</i> )	Bairdstrandläufer ( <i>Calidris bairdii</i> )	Sibirisches Schwarzkehlchen ( <i>Saxicola maurus</i> )
Zwerggans <sup>1</sup> ( <i>Anser erythropus</i> )	Graubrust-Strandläufer ( <i>Calidris melanotos</i> )	Isabellsteinschmätzer ( <i>Oenanthe isabellina</i> )
Ringelgans ( <i>Branta bernicla</i> )	Sandstrandläufer ( <i>Calidris pusilla</i> )	Nonnensteinschmätzer ( <i>Oenanthe pleschanka</i> )
Rothalsgans <sup>1,7</sup> ( <i>Branta ruficollis</i> )	Spitzschwanz-Strandläufer ( <i>Calidris acuminata</i> )	Mittelmeer-Steinschmätzer ( <i>Oenanthe hispanica</i> )
Nordamerikanische Pfeifente ( <i>Anas americana</i> )	Meerstrandläufer ( <i>Calidris maritima</i> )	Wüstensteinschmätzer ( <i>Oenanthe deserti</i> )
Sichelente ( <i>Anas falcata</i> )	Sumpfläufer <sup>1</sup> ( <i>Limicola falcinellus</i> )	Steinrötel <sup>6</sup> ( <i>Monticola saxatilis</i> )
Amerikanische Krickente ( <i>Anas carolinensis</i> )	Grasläufer ( <i>Tryngites subruficollis</i> )	Blaumerle ( <i>Monticola solitarius</i> )
Blaufügelente ( <i>Anas discors</i> )	Doppelschnepfe <sup>2</sup> ( <i>Gallinago media</i> )	Erddrossel ( <i>Zoothera dauma</i> )
Ringschnabelente ( <i>Aythya collaris</i> )	Dünnschnabel-Brachvogel ( <i>Numenius tenuirostris</i> )	Rostschwanzdrossel ( <i>Turdus naumanni</i> )
Kragente ( <i>Histrionicus histrionicus</i> )	Terekwasserläufer ( <i>Xenus cinereus</i> )	Rostflügeldrossel ( <i>Turdus eunomus</i> )
Schwarzkopf-Ruderente ( <i>Oxyura jamaicensis</i> )	Drosseluferläufer ( <i>Actitis macularius</i> )	Schwarzkehlrossel ( <i>Turdus atrogularis</i> )
Weißkopf-Ruderente ( <i>Oxyura leucocephala</i> )	Kleiner Gelbschenkel ( <i>Tringa flavipes</i> )	Wanderdrossel ( <i>Turdus migratorius</i> )
Steinhuhn <sup>6</sup> ( <i>Alectoris graeca</i> )	Thorshühnchen ( <i>Phalaropus fulicarius</i> )	Seidensänger ( <i>Cettia cetti</i> )
Eistaucher ( <i>Gavia immer</i> )	Spatelraubmöwe ( <i>Stercorarius pomarinus</i> )	Cistensänger ( <i>Cisticola juncidis</i> )
Gelbschnabeltaucher ( <i>Gavia adamsii</i> )	Schmarotzerraubmöwe ( <i>Stercorarius parasiticus</i> )	Buschspötter ( <i>Iduna caligata</i> )
Sepiasturtaucher ( <i>Calonectris diomedea</i> )	Falkenraubmöwe ( <i>Stercorarius longicaudus</i> )	Blassspötter ( <i>Iduna pallida</i> )
Mittelmeer-Sturmtaucher ( <i>Puffinus yelkouan</i> )	Skua ( <i>Stercorarius skua</i> )	Orpheusspötter ( <i>Hippolais polyglotta</i> )
Sturmschwalbe ( <i>Hydrobates pelagicus</i> )	Fischmöwe ( <i>Larus ichthyaetus</i> )	Mariskensänger <sup>6</sup> ( <i>Acrocephalus melanopogon</i> )
Wellenläufer ( <i>Oceanodroma leucorhoa</i> )	Präriemöwe ( <i>Larus pipixcan</i> )	Seggenrohrsänger ( <i>Acrocephalus paludicola</i> )
Basstörpel ( <i>Morus bassanus</i> )	Dünnschnabelmöwe ( <i>Larus genei</i> )	Feldrohrsänger ( <i>Acrocephalus agricola</i> )
Kormoran ( <i>Phalacrocorax carbo</i> ; nur Unterart <i>carbo</i> )	Ringschnabelmöwe ( <i>Larus delawarensis</i> )	Buschrohrsänger ( <i>Acrocephalus dumetorum</i> )
Krähenscharbe ( <i>Phalacrocorax aristotelis</i> )	Tundramöwe <sup>4</sup> ( <i>Larus fuscus heuglini</i> )	Weißbart-Grasmücke ( <i>Sylvia cantillans</i> )
Rosapelikan ( <i>Pelecanus onocrotalus</i> )	Polarmöwe ( <i>Larus glaucooides</i> )	Samtkopf-Grasmücke ( <i>Sylvia melanocephala</i> )
Krauskopfpelikan ( <i>Pelecanus crispus</i> )	Eismöwe ( <i>Larus hyperboreus</i> )	Orpheusgrasmücke ( <i>Sylvia hortensis</i> )
Kuhreiher <sup>1,3</sup> ( <i>Bubulcus ibis</i> )	Mantelmöwe ( <i>Larus marinus</i> )	Grünlaubsänger ( <i>Phylloscopus trochiloides</i> )
Sichler ( <i>Plegadis falcinellus</i> )	Dreizehenmöwe ( <i>Rissa tridactyla</i> )	Goldhähnchen-Laubsänger ( <i>Phylloscopus proregulus</i> )
Rosaflamingo ( <i>Phoenicopterus roseus</i> )	Schwalbenmöwe ( <i>Xema sabini</i> )	Gelbbrauen-Laubsänger ( <i>Phylloscopus inornatus</i> )
Gleitaar ( <i>Elanus caeruleus</i> )	Lachseeschwalbe ( <i>Gelochelidon nilotica</i> )	Dunkellaubsänger ( <i>Phylloscopus fuscatus</i> )
Schmutzgeier ( <i>Neophron percnopterus</i> )	Rüppellseeschwalbe ( <i>Sterna bengalensis</i> )	Zilpzal <sup>4</sup> ( <i>Phylloscopus collybita</i> ; nur Unterart <i>tristis</i> )
Mönchsgeier ( <i>Aegypius monachus</i> )	Brandseeschwalbe <sup>3</sup> ( <i>Sterna sandvicensis</i> )	Halbringschnäpper ( <i>Ficedula semitorquata</i> )
Schlangenadler ( <i>Circaetus gallicus</i> )	Rosenseeschwalbe ( <i>Sterna dougallii</i> )	Lasurmeise ( <i>Parus cyanus</i> )
Schlangenadler ( <i>Circaetus gallicus</i> )	Küstenseeschwalbe ( <i>Sterna paradisaea</i> )	Isabellwürger ( <i>Lanius isabellinus</i> )
Steppenweihe ( <i>Circus macrourus</i> )	Dickschnabellumme ( <i>Uria lomvia</i> )	Schwarzstirnwürger ( <i>Lanius minor</i> )
Kurzfangsperber ( <i>Accipiter brevipes</i> )	Tordalk ( <i>Alca torda</i> )	Raubwürger ( <i>Lanius excubitor</i> ; alle Unterarten außer <i>excubitor</i> )
Adlerbussard ( <i>Buteo rufinus</i> )	Trottellumme ( <i>Uria aalge</i> )	Rotkopfwürger ( <i>Lanius senator</i> )
Schreiadler ( <i>Aquila pomarina</i> )	Krabbenäcker ( <i>Alle alle</i> )	Alpendohle <sup>6</sup> ( <i>Pyrrhocorax graculus</i> )
Schelladler ( <i>Aquila clanga</i> )	Papageitaucher ( <i>Fratercula arctica</i> )	Alpenkrähe ( <i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i> )
Kaiseradler <sup>6</sup> ( <i>Aquila heliaca</i> )	Steppenflughuhn ( <i>Syrhaptes paradoxus</i> )	Rosenstar ( <i>Pastor roseus</i> )
Steppenadler ( <i>Aquila nipalensis</i> )	Orienturteltaube ( <i>Streptopelia orientalis</i> )	Steinsperling ( <i>Petronia petronia</i> )
Zwergadler ( <i>Aquila pennata</i> )	Häherkuckuck ( <i>Ciamator glandarius</i> )	Schneesperling <sup>6</sup> ( <i>Montifringilla nivalis</i> )
Habichtsadler ( <i>Aquila fasciata</i> )	Schnee-Eule ( <i>Bubo scandiacus</i> )	Zitronengirlitz <sup>6</sup> ( <i>Serinus citrinella</i> )
Rötelfalke ( <i>Falco naumanni</i> )	Sperbereule ( <i>Sumia ulula</i> )	Berghänfling <sup>1</sup> ( <i>Carduelis flavirostris</i> )
Eleonorenfalke ( <i>Falco eleonora</i> )	Blauracke <sup>6</sup> ( <i>Coracias garrulus</i> )	Polarbirkenzeisig ( <i>Carduelis homemanni</i> )
Sakerfalke <sup>6</sup> ( <i>Falco cherrug</i> )	Blauwangenspiet ( <i>Merops persicus</i> )	Bindenkreuzschnabel ( <i>Loxia leucoptera</i> )
Gerfalke ( <i>Falco rusticolus</i> )	Kalanderlerche ( <i>Melanocorypha calandra</i> )	Kiefernkreuzschnabel ( <i>Loxia pytyopsittacus</i> )
Zwergsumpfhuhn ( <i>Porzana pusilla</i> )	Weißflügellere ( <i>Melanocorypha leucoptera</i> )	Wüstengimpel ( <i>Bucanetes githagineus</i> )
Purpurhuhn ( <i>Porphyrio porphyrio</i> )	Mohrenlerche ( <i>Melanocorypha yeltoniensis</i> )	Hakengimpel ( <i>Pinicola enucleator</i> )
Zwergtrappe ( <i>Tetrax tetrax</i> )	Kurzzehenlerche ( <i>Calandrella brachydactyla</i> )	Spornammer ( <i>Calcarius lapponicus</i> )
Großtrappe <sup>6</sup> ( <i>Otis tarda</i> )	Stummelherche ( <i>Calandrella rufescens</i> )	Fichtenammer ( <i>Emberiza leucocephalos</i> )
Steppenkrantappe ( <i>Chlamydotis macqueenii</i> )	Ohrenlerche ( <i>Eremophila alpestris</i> )	Zaunammer <sup>6</sup> ( <i>Emberiza cirius</i> )
Jungfernkranich ( <i>Anthropoides virgo</i> )	Rötelschwalbe ( <i>Cecropis daurica</i> )	Grauortolan ( <i>Emberiza caesia</i> )
Rennvogel ( <i>Cursorius cursor</i> )	Spornpieper ( <i>Anthus richardi</i> )	Waldammer ( <i>Emberiza rustica</i> )
Rotflügel-Brachschwalbe ( <i>Glaucula pratensis</i> )	Waldpieper ( <i>Anthus hodgsoni</i> )	Zwergammer ( <i>Emberiza pusilla</i> )
Schwarzflügel-Brachschwalbe ( <i>Glaucula nordmanni</i> )	Strandpieper ( <i>Anthus petrosus</i> )	Kappenammer ( <i>Emberiza melanocephala</i> )
Seeregenpfeifer <sup>1,3</sup> ( <i>Charadrius alexandrinus</i> )	Schafstelze ( <i>Motacilla flava</i> ; alle Unterarten außer <i>cinereocapilla</i> , <i>feldegg</i> , <i>flava</i> , <i>thunbergi</i> )	
Wüstenregenpfeifer ( <i>Charadrius leschenaultii</i> )	Zitronenstelze ( <i>Motacilla citreola</i> )	
Pazifischer Goldregenpfeifer ( <i>Pluvialis fulva</i> )	Bachstelze <sup>4</sup> ( <i>Motacilla alba</i> ; alle Unterarten außer <i>alba</i> )	
Amerikanischer Goldregenpfeifer ( <i>Pluvialis dominica</i> )	Bergbraunelle ( <i>Prunella montanella</i> )	
Steppenkiebitz ( <i>Vanellus gregarius</i> )		

## Legende

<sup>1</sup> nur Feststellungen abseits des Neusiedler See/Seewinkel.

<sup>2</sup> wie oben, gilt aber nur für Frühjahrszug.

<sup>3</sup> nur Feststellungen abseits des Bodenseegebietes.

<sup>4</sup> nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung werden behandelt.

<sup>6</sup> nur Feststellungen abseits der etablierten Brut- (siehe z.B. Dvorak et al., Atlas der Brutvögel Österreichs, 1993 bzw. Aufforderung zur Meldung nach Eingabe auf [www.ornitho.at](http://www.ornitho.at)), Sommer-, Zug- und Winterverbreitungsgebiete.

<sup>7</sup> nur sofern angenommen wird, dass es sich um Wildvögel und nicht um freigesetzte, entkommene bzw. verwilderte Vögel handelt. Neben der Beschreibung des Vogels sind vor allem die Beobachtungsumstände, die zu dieser Annahme führten, zu detaillieren.

## Änderungen

Ab 1.1.2020: Nachweise von Felsenschwalbe und Alpenbraunelle werden österreichweit nicht mehr und solche des Kaiseradlers auch aus den Bezirken Perg, Linz, Linz-Land, Steyr und Steyr-Land nicht mehr behandelt.

Nachweise der Großstrappe abseits des Brutgebietes bzw. des regelmäßigen Aktionsraumes sind künftig an die AFK zu melden.

Ab 1.1.2019: Nachweise der Zaunammer aus Niederösterreich und Wien werden nicht mehr behandelt.

Änderungen ab 19.11.2017: Nachweise der Weißwangengans, Zwergscharbe, Gänsegeier, Steinadler, Mornellregenpfeifer und Alpensegler werden künftig nicht mehr behandelt. Räumliche Überarbeitungen der Meldepflicht betreffen (in Klammer die Region, aus denen die Meldepflicht entfällt): Zwerggans (Neusiedler See-Gebiet), Kuhreiher (Neusiedler See- und Bodensee-Gebiet), Kaiseradler (Niederösterreich), Sakerfalke (Niederösterreich mit Ausnahme des Mostviertels), Zaunammer (Wachau und Wagram, rückwirkend ab 1.1.2017 nicht zu melden).

Änderungen ab 1.7.2016: Nachweise der Zwergscharbe aus dem gesamten Burgenland, sowie aus den steirischen Bezirken Südoststeiermark, Leibnitz, Hartberg-Fürstenfeld, Graz und Graz Umgebung werden künftig nicht mehr behandelt. Ebenfalls fällt die Protokollpflicht für Beobachtungen des Raufußbussards aus ganz Österreich.

Änderung ab 8.12.2012: Aufgrund neuer Erkenntnisse zur sicheren Bestimmung werden Nachweise aller Unterarten der Bachstelze (außer *alba*, insbesondere *yarrellii*) nur mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

Änderungen ab 1.1.2010: Für die folgenden Arten sind keine Dokumentationen an die AFK mehr erforderlich. Für alle diese Arten wird aber ersucht, die Beobachtungen via [www.ornitho.at](http://www.ornitho.at) an BirdLife Österreich zu melden.

- Rostgans: Wildvögel können ohnedies nicht mehr gesichert nachgewiesen werden (außer über Ringfunde) und alle anderen Nachweise der Kategorien C und E werden nicht von der AFK gesammelt.
- Bartgeier: Wildvögel können im Alpenraum aufgrund des Wiedereinbürgerungsprogrammes nicht von Vögeln der Kategorie D/E bzw. zukünftig C getrennt werden. Es wird jedoch explizit ersucht alle Meldungen von Bartgeiern an das Monitoringprogramm (z.B. [bartgeier@gmx.at](mailto:bartgeier@gmx.at)) zu melden.
- Zwergohreule
- Habichtskauz: 2009 begonnenes Aussetzungsprogramm im Wienerwald und im Dürrensteingebiet; Vögel des Aussetzungsprogrammes aus dem Böhmerwald; etabliertes Brutvorkommen in Kärnten.
- Doppelschnepfen müssen im Frühjahr nur mehr abseits des Neusiedler See-Gebietes an die AFK gemeldet werden (alljährlicher Durchzügler im Frühjahr).
- Zwergseeschwalbe

Folgende Arten wurden in die Liste der zu meldenden Arten aufgenommen bzw. bisher geltende räumliche Einschränkungen gestrichen:

- Sichler: nunmehr auch aus dem Neusiedler See-Gebiet an die AFK melden.
- Mantelmöwe: nunmehr auch aus dem Bodenseegebiet an die AFK melden. Bei beiden Arten sind die entsprechenden Nachweise derart zurückgegangen, dass eine uneingeschränkte Aufnahme in die Liste der zu meldenden Arten erforderlich ist.
- Raufußbussard: neu abseits der etablierten Winterverbreitungsgebiete (NÖ und N-Burgenland) an die AFK melden. Eine Durchsicht der Nachweise dieser Art abseits des genannten Raumes zeigte die Seltenheit der Art und die mangelhafte Dokumentation über Belege (Fotos).
- Neu nachgewiesene Unterarten: Kormoran der atlantischen Unterart *carbo* sowie Tundramöwe (*Larus fuscus heuglini*). Von letzterer werden (so wie von der Unterart *tristis* des Zilpzalps) aufgrund der ausgesprochen schwierigen Bestimmung nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

Änderungen ab 29.11.2009: Zwergscharben müssen rückwirkend ab 2009 aus dem Neusiedler See-Gebiet nicht mehr an die AFK gemeldet werden (etablierter Brutvogel, Mausegast, je nach Vereisung auch im Winter anwesend).

