

Welche seltenen Vogelarten sollen an die AFK gemeldet werden?

Which bird species should be reported to the AFK?

Herausgegeben von der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich, letzte Änderung 12.3.2022
Published by the Austrian Avifaunistic Committee (AFK) of BirdLife Austria, updated 12th March 2022



Legende

- ¹ nur Feststellungen abseits des Neusiedler See/Seewinkel.
- ² ausgenommen Beobachtungen am Frühjahrszug im Neusiedler See-Gebiet.
- ³ nur Feststellungen abseits des Bodenseegebietes.
- ⁴ nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung werden behandelt.
- ⁵ nur Nachweise ab dem 1. Juli.
- ⁶ nur Feststellungen abseits der etablierten Brutgebiete (siehe z.B. Dvorak et al., Atlas der Brutvögel Österreichs, 1993), Sommer-, Zug- und Winterverbreitungsgebiete (bei Aufforderung nach Eingabe auf ornitho.at).
- ⁷ nur sofern angenommen wird, dass es sich um Wildvögel und nicht um freigesetzte, entkommene bzw. verwilderte Vögel handelt. Neben der Beschreibung des Vogels sind vor allem die Beobachtungsumstände, die zu dieser Annahme führten, zu detaillieren.
- ⁸ nur Feststellungen von Vögeln deren Herkunft gesichert ist (z.B. durch Beringung).
- ⁹ nur Feststellungen aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg.

Allgemeines

Die letzten Änderungen finden sich auf Seite 2. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, wenn Arten nach Revisionen von der österreichischen Artenliste gestrichen wurden oder durch anerkannte Erstnachweise neue Arten hinzugekommen sind. Außerdem erfolgen Aktualisierungen, um systematische und taxonomische Änderungen in der österreichischen Artenliste zu übernehmen. Die folgende Liste jener Arten bzw. Unterarten, die an die Avifaunistische Kommission (mittels des Online-Meldeformulars auf www.birdlife-afk.at) gemeldet werden sollen, enthält nur Arten, die bisher als Wildvögel oder aus verwilderten Populationen stammend in Österreich nachgewiesen worden sind. Zusätzlich sind Beobachtungen von Arten oder Unterarten, die bisher noch nicht in Österreich als Wildvogel festgestellt worden sind und bei denen ein Auftreten als Wildvogel vermutet wird an die AFK zu melden.

Ringelgans (<i>Branta bernicla</i>)	Lachseschwalbe (<i>Gelocheilidon nilotica</i>)	Rötelschwalbe (<i>Cecropis daurica</i>)
Rothalsgans ^{1,7} (<i>Branta ruficollis</i>)	Rüppellseeschwalbe (<i>Thalasseus bengalensis</i>)	Seidensänger (<i>Cettia cetti</i>)
Waldsaatgans (<i>Anser fabalis</i>)	Rosenseeschwalbe (<i>Sterna dougalli</i>)	Gelbbrauen-Laubsänger (<i>Phylloscopus inornatus</i>)
Kurzschnabelgans (<i>Anser brachyrhynchus</i>)	Küstenseeschwalbe (<i>Sterna paradisaea</i>)	Goldhähnchen-Laubsänger (<i>Phylloscopus proregulus</i>)
Blässgans (<i>Anser albifrons</i> ; alle ssp. außer <i>albifrons</i>)	Skua (<i>Stercorarius skua</i>)	Dunkellaubsänger (<i>Phylloscopus fuscatus</i>)
Zwerggans ¹ (<i>Anser erythropus</i>)	Spatelraubmöwe (<i>Stercorarius pomarinus</i>)	Zilpzalp ⁴ (<i>Phylloscopus collybita</i> ; nur Unterart <i>tristis</i>)
Zwergschwan ³ (<i>Cygnus columbianus</i>)	Schmarotzerraubmöwe (<i>Stercorarius parasiticus</i>)	Grünlaubsänger (<i>Phylloscopus trochiloides</i>)
Blauflügelente (<i>Spatula discors</i>)	Falkenraubmöwe (<i>Stercorarius longicaudus</i>)	Mariskenrohrsänger ⁶ (<i>Acrocephalus melanopogon</i>)
Sichelente (<i>Mareca falcata</i>)	Krabben-Taucher (<i>Alle alle</i>)	Seggenrohrsänger (<i>Acrocephalus paludicola</i>)
Nordamerikanische Pfeifente (<i>Mareca americana</i>)	Dickschnabellumme (<i>Uria lomvia</i>)	Feldrohrsänger (<i>Acrocephalus agricola</i>)
Amerikanische Krickente (<i>Anas carolinensis</i>)	Trottellumme (<i>Uria aalge</i>)	Buschrohrsänger (<i>Acrocephalus dumetorum</i>)
Ringschnabelente (<i>Aythya collaris</i>)	Tordalk (<i>Alca torda</i>)	Buschspötter (<i>Iduna caligata</i>)
Kragenente (<i>Histrionicus histrionicus</i>)	Papageitaucher (<i>Fratercula arctica</i>)	Blassspötter (<i>Iduna pallida</i>)
Schwarzkopf-Ruderente (<i>Oxyura jamaicensis</i>)	Eistaucher (<i>Gavia immer</i>)	Orpheusspötter (<i>Hippolais polyglotta</i>)
Weißkopf-Ruderente (<i>Oxyura leucocephala</i>)	Gelbschnabeltaucher (<i>Gavia adamsii</i>)	Zistensänger (<i>Cisticola juncidis</i>)
Steinhuhn ⁸ (<i>Alectoris graeca</i>)	Sturmwellenläufer (<i>Hydrobates pelagicus</i>)	Orpheusgrasmücke (<i>Curruca hortensis</i>)
Großtrappe ⁶ (<i>Otis tarda</i>)	Wellenläufer (<i>Hydrobates leucorhous</i>)	Wüstengrasmücke (<i>Curruca nana</i>)
Steppenkrantappe (<i>Chlamydotis macqueenii</i>)	Sepiasturmtaucher (<i>Calonectris diomedea</i>)	Samtkopf-Grasmücke (<i>Curruca melanocephala</i>)
Zwergtrappe (<i>Tetrax tetrax</i>)	Mittelmeer-Sturmtaucher (<i>Puffinus yelkouan</i>)	Balkan-Bartgrasmücke (<i>Curruca cantillans</i>)
Häherkuckuck (<i>Clamator glandarius</i>)	Basstöpel (<i>Morus bassanus</i>)	Rosenstar ⁵ (<i>Pastor roseus</i>)
Steppenflughuhn (<i>Syrhaptes paradoxus</i>)	Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i> ; nur Unterart <i>carbo</i>)	Erddrossel (<i>Zoothera aurea</i>)
Orienturtaube (<i>Streptopelia orientalis</i>)	Krähenscharbe (<i>Gulosus aristotelis</i>)	Schwarzkehlrossel (<i>Turdus atrogularis</i>)
Purpurhuhn (<i>Porphyrio porphyrio</i>)	Heiliger Ibis ¹ (<i>Threskiornis aethiopicus</i>)	Rostflügelrossel (<i>Turdus eunomus</i>)
Zwergsumpfhuhn (<i>Zapornia pusilla</i>)	Sichler (<i>Plegadis falcinellus</i>)	Rostschwanzdrossel (<i>Turdus naumanni</i>)
Jungfernkranich (<i>Grus virgo</i>)	Kuhreiher ^{1,3} (<i>Bubulcus ibis</i>)	Wanderdrossel (<i>Turdus migratorius</i>)
Rosaflamingo (<i>Phoenicopterus roseus</i>)	Rosapelikan (<i>Pelecanus onocrotalus</i>)	Sprosser (<i>Luscinia luscinia</i>)
Steppenkiebitz (<i>Vanellus gregarius</i>)	Krauskopfpelikan (<i>Pelecanus crispus</i>)	Halbringschnäpper (<i>Ficedula semitorquata</i>)
Weißschwanzkiebitz (<i>Vanellus leucurus</i>)	Gleitaar (<i>Elanus caeruleus</i>)	Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros</i> ; alle Unterarten außer <i>gibraltariensis</i>)
Pazifischer Goldregenpfeifer (<i>Pluvialis fulva</i>)	Schmutzgeier (<i>Neophron percnopterus</i>)	Steinrötel ⁶ (<i>Monticola saxatilis</i>)
Amerikanischer Goldregenpfeifer (<i>Pluvialis dominica</i>)	Mönchsgeier (<i>Aegypius monachus</i>)	Blaumerle (<i>Monticola solitarius</i>)
Seereggenpfeifer ^{1,3} (<i>Charadrius alexandrinus</i>)	Schlangenadler (<i>Circaetus gallicus</i>)	Sibirisches Schwarzkehlchen (<i>Saxicola maurus</i>)
Wüstenregenpfeifer (<i>Charadrius leschenaultii</i>)	Schreiadler (<i>Clanga pomarina</i>)	Isabellsteinschmätzer (<i>Oenanthe isabellina</i>)
Dünnschnabel-Brachvogel (<i>Numenius tenuirostris</i>)	Schelladler (<i>Clanga clanga</i>)	Wüstensteinschmätzer (<i>Oenanthe deserti</i>)
Sumpfläufer ¹ (<i>Calidris falcinellus</i>)	Zwergadler (<i>Aquila pennata</i>)	Nonnensteinschmätzer (<i>Oenanthe pleschanka</i>)
Weißbüzel-Strandläufer (<i>Calidris fuscicollis</i>)	Steppenadler (<i>Aquila nipalensis</i>)	Balkansteinschmätzer (<i>Oenanthe melanoleuca</i>)
Grasläufer (<i>Calidris subruficollis</i>)	Kaiseradler ⁹ (<i>Aquila heliaca</i>)	Steinsperling (<i>Petronia petronia</i>)
Bairdstrandläufer (<i>Calidris bairdii</i>)	Habichtsadler (<i>Aquila fasciata</i>)	Schneesperling ⁸ (<i>Montifringilla nivalis</i>)
Graubrust-Strandläufer (<i>Calidris melanotos</i>)	Kurzfangsperber (<i>Accipiter brevipes</i>)	Bergbraunelle (<i>Prunella montanella</i>)
Sandstrandläufer (<i>Calidris pusilla</i>)	Sperbereule (<i>Sumia ulula</i>)	Schafstelze (<i>Motacilla flava</i> ; alle Unterarten außer <i>cinereocapilla</i> , <i>feldegg</i> , <i>flava</i> , <i>thunbergi</i>)
Meerstrandläufer (<i>Calidris maritima</i>)	Schneeeule (<i>Bubo scandiacus</i>)	Zitronenstelze ⁵ (<i>Motacilla citreola</i>)
Spitzschwanz-Strandläufer (<i>Calidris acuminata</i>)	Blauracke ⁵ (<i>Coracias garrulus</i>)	Bachstelze ⁴ (<i>Motacilla alba</i> ; alle Unterarten außer <i>alba</i>)
Doppelschnepfe ² (<i>Gallinago media</i>)	Blauwangenspint (<i>Merops persicus</i>)	Spornpieper (<i>Anthus richardi</i>)
Terekwasserläufer (<i>Xenus cinereus</i>)	Rötelfalke (<i>Falco naumanni</i>)	Waldpieper (<i>Anthus hodgsoni</i>)
Thorshühnchen (<i>Phalaropus fulicarius</i>)	Eleonorenfalke (<i>Falco eleonora</i>)	Strandpieper (<i>Anthus petrosus</i>)
Drosseluferläufer (<i>Actitis macularia</i>)	Sakerfalke ⁶ (<i>Falco cherrug</i>)	Hakengimpel (<i>Pinicola enucleator</i>)
Kleiner Gelbschenkel (<i>Tringa flavipes</i>)	Gerfalke (<i>Falco rusticolus</i>)	Wüstengimpel (<i>Bucanetes githagineus</i>)
Rennvogel (<i>Cursorius cursor</i>)	Isabellwürger (<i>Lanius isabellinus</i>)	Berghänfling ¹ (<i>Carduelis flavirostris</i>)
Rotflügel-Brachschwalbe (<i>Glareola pratincola</i>)	Schwarzstirnwürger (<i>Lanius minor</i>)	Polarbirkenzeisig (<i>Carduelis hornemanni</i>)
Schwarzflügel-Brachschwalbe (<i>Glareola nordmanni</i>)	Raubwürger (<i>Lanius excubitor</i> , alle Unterarten außer <i>excubitor</i>)	Kiefernkreuzschnabel (<i>Loxia pytyopsittacus</i>)
Dünnschnabelmöwe (<i>Chroicocephalus genei</i>)	Rotkopfwürger (<i>Lanius senator</i>)	Bindenkreuzschnabel (<i>Loxia leucoptera</i>)
Präriemöwe (<i>Leucophaeus pipixcan</i>)	Alpenkrähe (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)	Zitronenzeisig ⁸ (<i>Serinus citrinella</i>)
Fischmöwe (<i>Ichthyophaga ichthyophaga</i>)	Alpendohle ⁶ (<i>Pyrrhocorax graculus</i>)	Spornammer (<i>Calcarius lapponicus</i>)
Ringschnabelmöwe (<i>Larus delawarensis</i>)	Lasurmeise (<i>Cyanistes cyaneus</i>)	Fichtenammer (<i>Emberiza leucocephalos</i>)
Mantelmöwe (<i>Larus marinus</i>)	Weißflügellerte (<i>Alauda leucoptera</i>)	Zaunammer ⁶ (<i>Emberiza cirius</i>)
Eismöwe (<i>Larus hyperboreus</i>)	Ohrenlerche (<i>Eremophila alpestris</i>)	Grauortolan (<i>Emberiza caesia</i>)
Polarmöwe (<i>Larus glaucoides</i>)	Kurzzehenlerche (<i>Calandrella brachydactyla</i>)	Zwergammer (<i>Emberiza pusilla</i>)
Heringsmöwe (<i>Larus fuscus</i> ; nur Unterarten <i>graellsi</i> ⁸ und <i>heuglini</i> ⁸)	Bergkalenderlerche (<i>Melanocorypha bimaculata</i>)	Waldammer (<i>Emberiza rustica</i>)
Dreizehenmöwe (<i>Rissa tridactyla</i>)	Kalenderlerche (<i>Melanocorypha calandra</i>)	Kappenammer (<i>Emberiza melanocephala</i>)
Schwalbenmöwe (<i>Xema sabinii</i>)	Schwarzsteppenlerche (<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>)	
	Stummelerte (<i>Alaudala rufescens</i>)	

Änderungen in dieser Liste (chronologisch)

Ab 1.1.2022: Parallel zur neuen „Artenliste der Vögel Österreichs“ (Dez. 2021) wurde auch die Taxonomie dieser Liste angepasst und folgt nun der „World Bird List“ in der Fassung 11.2 des IOC (Gill et al. 2021). Nachweise des Kaiseradlers sind nur noch aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg zu melden.

Ab 1.1.2021: Nachweise der Unterart *graelisii* der Heringsmöwe sind künftig zu melden. Adlerbussard, Steppenweihe und Brandseeschwalbe werden von der Dokumentationspflicht gestrichen. Für Zitronenstelze und Rosenstar sind nur Meldungen in der zweiten Jahreshälfte ab 1.7. dokumentationspflichtig. Die Waldsaatgans wird neu in die Liste der dokumentationspflichtigen Arten aufgenommen.

Ab 1.1.2020: Nachweise von Felsenschwalbe und Alpenbraunelle werden österreichweit nicht mehr und solche des Kaiseradlers auch aus den oberösterreichischen Bezirken Perg, Linz, Linz-Land, Steyr und Steyr-Land nicht mehr behandelt. Nachweise der Großtrappe abseits des Brutgebietes bzw. des regelmäßigen Aktionsraumes sind künftig an die AFK zu melden.

Ab 1.1.2019: Nachweise der Zaunammer aus Niederösterreich und Wien werden nicht mehr behandelt.

Ab 19.11.2017: Nachweise der Weißwangengans, Zwergscharbe, Gänsegeier, Steinadler, Mornellregenfeifer und Alpensegler werden künftig nicht mehr behandelt. Räumliche Überarbeitungen der Meldepflicht betreffen (in Klammer die Region, aus denen die Meldepflicht entfällt): Zwerggans (Neusiedler See-Gebiet), Kuhreiher (Neusiedler See- und Bodensee-Gebiet), Kaiseradler (Niederösterreich), Sakerfalke (Niederösterreich mit Ausnahme des Mostviertels), Zaunammer (Wachau und Wagram, rückwirkend ab 1.1.2017 nicht zu melden).

Ab 1.7.2016: Nachweise der Zwergscharbe aus dem gesamten Burgenland, sowie aus den steirischen Bezirken Südoststeiermark, Leibnitz, Hartberg-Fürstenfeld, Graz und Graz Umgebung werden künftig nicht mehr behandelt. Ebenfalls fällt die Protokollpflicht für Beobachtungen des Raufußbussards aus ganz Österreich.

Ab 8.12.2012: Aufgrund neuer Erkenntnisse zur sicheren Bestimmung werden Nachweise aller Unterarten der Bachstelze (außer *alba*, insbesondere *yarrellii*) nur mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

Ab 1.1.2010: Für die folgenden Arten ist keine Dokumentation an die AFK mehr erforderlich. Für alle diese Arten wird aber ersucht, die Beobachtungen via www.omitho.at an BirdLife Österreich zu melden. Rostgans: Wildvögel können nicht mehr gesichert nachgewiesen werden (außer über Ringfunde) und alle anderen Nachweise der Kategorien C und E werden nicht von der AFK gesammelt. Bartgeier: Wildvögel können im Alpenraum aufgrund des Wiedereinbürgerungsprogrammes nicht von Vögeln der Kategorie D/E bzw. zukünftig C getrennt werden. Es wird jedoch explizit ersucht alle Meldungen von Bartgeiern auf www.omitho.at zu melden. Zwergohreule. Habichtskauz: 2009 begonnenes Aussetzungsprogramm im Wienerwald und im Dürrensteingebiet; Vögel des Aussetzungsprogrammes aus dem Böhmerwald; etabliertes Brutvorkommen in Kärnten. Doppelschnepfen müssen im Frühjahr nur mehr abseits des Neusiedler See-Gebietes an die AFK gemeldet werden (alljährlicher Durchzügler im Frühjahr). Zwergseeschwalbe. Folgende Arten wurden in die Liste der zu meldenden Arten aufgenommen bzw. bisher geltende räumliche Einschränkungen gestrichen: Sichler: nunmehr auch aus dem Neusiedler See-Gebiet an die AFK melden. Mantelmöwe: nunmehr auch aus dem Bodenseegebiet an die AFK melden. Bei beiden Arten sind die entsprechenden Nachweise derart zurückgegangen, dass eine uneingeschränkte Aufnahme in die Liste der zu meldenden Arten erforderlich ist. Raufußbussard: neu abseits der etablierten Winterverbreitungsgebiete (NÖ und N-Burgenland) an die AFK melden. Eine Durchsicht der Nachweise dieser Art abseits des genannten Raumes zeigte die Seltenheit der Art und die mangelhafte Dokumentation über Belege (Fotos). Neu nachgewiesene Unterarten: Kormoran der atlantischen Unterart *carbo* sowie Tundramöwe (*Larus fuscus heuglini*). Von letzterer werden (so wie von der Unterart *tristis* des Zillpals) aufgrund der ausgesprochen schwierigen Bestimmung nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

Ab 29.11.2009: Zwergscharben müssen rückwirkend ab 2009 aus dem Neusiedler See-Gebiet nicht mehr an die AFK gemeldet werden (etablierter Brutvogel, Mauseergast, je nach Vereisung auch im Winter anwesend).

