

# Welche seltenen Vogelarten sollen an die AFK gemeldet werden?

## Which bird species should be reported to the AFK?

Herausgegeben von der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich, letzte Änderung 21.11.2024  
Published by the Austrian Avifaunistic Committee (AFK) of BirdLife Austria, updated 21th November 2024



www.birdlife-afk.at

### Legende

- <sup>1</sup> nur Feststellungen abseits des Neusiedler See/Seewinkel.
- <sup>2</sup> ausgenommen Beobachtungen am Frühjahrszug im Neusiedler See-Gebiet.
- <sup>3</sup> nur Feststellungen abseits des Bodenseegebietes.
- <sup>4</sup> nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung werden behandelt.
- <sup>5</sup> nur Nachweise ab dem 1. Juli.
- <sup>6</sup> nur Feststellungen abseits etablierter Brutgebiete (siehe z.B. Teufelbauer et al., Atlas der Brutvögel Österreichs, 2024), Sommer-, Zug- und Winterverbreitungsgebiete (bei Aufforderung nach Eingabe auf ornitho.at).
- <sup>7</sup> nur sofern angenommen wird, dass es sich um Wildvögel und nicht um freigesetzte, entkommene bzw. verwilderte Vögel handelt. Neben der Beschreibung des Vogels sind vor allem die Beobachtungsumstände, die zu dieser Annahme führten, zu detaillieren.
- <sup>8</sup> nur Feststellungen von Vögeln deren Herkunft gesichert ist (z.B. durch Beringung).
- <sup>9</sup> nur Feststellungen aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg.

### Allgemeines

Die letzten Änderungen finden sich auf Seite 2. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, wenn Arten nach Revisionen von der österreichischen Artenliste gestrichen wurden oder durch anerkannte Erstnachweise neue Arten hinzugekommen sind. Außerdem erfolgen Aktualisierungen, um systematische und taxonomische Änderungen in der österreichischen Artenliste zu übernehmen. Die folgende Liste jener Arten bzw. Unterarten, die an die Avifaunistische Kommission (mittels des Online-Meldeformulars auf [www.birdlife-afk.at](http://www.birdlife-afk.at)) gemeldet werden sollen, enthält nur Arten, die bisher als Wildvögel oder aus verwilderten Populationen stammend in Österreich nachgewiesen worden sind. Zusätzlich sind Beobachtungen von Arten oder Unterarten, die bisher noch nicht in Österreich als Wildvogel festgestellt worden sind und bei denen ein Auftreten als Wildvogel vermutet wird an die AFK zu melden.

Ringelgans (*Branta bernicla*)  
Rothalsgans<sup>1,7</sup> (*Branta ruficollis*)  
Waldsaatgans (*Anser fabalis*)  
Kurzschwanzgans (*Anser brachyrhynchus*)  
Blässgans (*Anser albifrons*; alle ssp. außer *albifrons*)  
Zwerggans<sup>1</sup> (*Anser erythropus*)  
Zwergschwan<sup>3</sup> (*Cygnus columbianus*)  
Blaufügelente (*Spatula discors*)  
Sichelente (*Mareca falcata*)  
Nordamerikanische Pfeifente (*Mareca americana*)  
Amerikanische Krickente (*Anas carolinensis*)  
Ringschnabelente (*Aythya collaris*)  
Kragente (*Histrionicus histrionicus*)  
Schwarzkopf-Ruderente (*Oxyura jamaicensis*)  
Weißkopf-Ruderente (*Oxyura leucocephala*)  
Steinhuhn<sup>8</sup> (*Alectoris graeca*)  
Fahlsegler (*Apus pallidus*)  
Großstrappe<sup>6</sup> (*Otis tarda*)  
Steppenkragentrappe (*Chlamydotis macqueenii*)  
Zwergtrappe (*Tetrax tetrax*)  
Häherkuckuck (*Clamator glandarius*)  
Steppenflughuhn (*Syrhaptes paradoxus*)  
Orienturzeltaube (*Streptopelia orientalis*)  
Purpurhuhn (*Porphyrio porphyrio*)  
Zwergsumpfhuhn (*Zapornia pusilla*)  
Jungfernkranich (*Grus virgo*)  
Rosaflamingo (*Phoenicopterus roseus*)  
Steppenkiebitz (*Vanellus gregarius*)  
Weißschwanzkiebitz (*Vanellus leucurus*)  
Pazifischer Goldregenpfeifer (*Pluvialis fulva*)  
Amerikanischer Goldregenpfeifer (*Pluvialis dominica*)  
Seeregenpfeifer<sup>1,3</sup> (*Charadrius alexandrinus*)  
Wüstenregenpfeifer (*Charadrius leschenaultii*)  
Dünnschnabel-Brachvogel (*Numenius tenuirostris*)  
Sumpfläufer<sup>1</sup> (*Calidris falcinellus*)  
Weißbürzel-Strandläufer (*Calidris fuscicollis*)  
Grasläufer (*Calidris subruficollis*)  
Bairdstrandläufer (*Calidris bairdii*)  
Graubrust-Strandläufer (*Calidris melanotos*)  
Sandstrandläufer (*Calidris pusilla*)  
Meerstrandläufer (*Calidris maritima*)  
Spitzschwanz-Strandläufer (*Calidris acuminata*)  
Doppelschnepfe<sup>2</sup> (*Gallinago media*)  
Terekwasserläufer (*Xenus cinereus*)  
Thorshühnchen (*Phalaropus fulicarius*)  
Drosseluferläufer (*Actitis macularius*)  
Kleiner Gelbschenkel (*Tringa flavipes*)  
Rennvogel (*Cursorius cursor*)  
Rotflügel-Brachschwalbe (*Glaucola pratincola*)  
Schwarzflügel-Brachschwalbe (*Glaucola nordmanni*)  
Dünnschnabelmöwe (*Chroicocephalus genei*)  
Präriemöwe (*Leucophaea pipixcan*)  
Fischmöwe (*Ichthyaeetus ichthyaeetus*)  
Korallenmöwe (*Ichthyaeetus audouinii*)  
Sturmöwe (*Larus canus*; nur Unterart *heinei*)  
Ringschnabelmöwe (*Larus delawarensis*)  
Mantelmöwe (*Larus marinus*)  
Eismöwe (*Larus hyperboreus*)  
Polarmöwe (*Larus glaucooides*)  
Heringsmöwe (*Larus fuscus*; nur Unterarten *graellsii*<sup>9</sup> und *heuglinii*<sup>9</sup>)  
Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*)

Schwalbenmöwe (*Xema sabini*)  
Lachseschwalbe (*Gelochelidon nilotica*)  
Rüppellseeschwalbe (*Thalasseus bengalensis*)  
Rosenseschwalbe (*Sterna dougallii*)  
Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*)  
Skua (*Stercorarius skua*)  
Spatelraumbmöwe (*Stercorarius pomarinus*)  
Schmarotzerraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*)  
Falkenraumbmöwe (*Stercorarius longicaudus*)  
Krabentaucher (*Alle alle*)  
Dickschnabellumme (*Uria lomvia*)  
Trottellumme (*Uria aalge*)  
Tordalk (*Alca torda*)  
Papageitaucher (*Fratercula arctica*)  
Eistaucher (*Gavia immer*)  
Gelbschnabeltaucher (*Gavia adamsii*)  
Sturmwellenläufer (*Hydrobates pelagicus*)  
Wellenläufer (*Hydrobates leucorhous*)  
Sepiasturmtaucher (*Calonectris diomedea*)  
Mittelmeer-Sturmtaucher (*Puffinus yelkouan*)  
Basstöpel (*Morus bassanus*)  
Krähenscharbe (*Gulosus aristotelis*)  
Heiliger Ibis<sup>7</sup> (*Threskiornis aethiopicus*)  
Sichler (*Plegadis falcinellus*)  
Rosapelikan (*Pelecanus onocrotalus*)  
Krauskopfpelikan (*Pelecanus crispus*)  
Gleitaar (*Elanus caeruleus*)  
Schmutzgeier (*Neophron percnopterus*)  
Mönchsgeier (*Aegypius monachus*)  
Schlangenaadler (*Circaetus gallicus*)  
Schreiadler (*Clanga pomarina*)  
Schelladler (*Clanga clanga*)  
Zwergadler (*Aquila pennata*)  
Steppenadler (*Aquila nipalensis*)  
Kaiseradler<sup>8</sup> (*Aquila heliaca*)  
Habichtsadler (*Aquila fasciata*)  
Kurzfangsperber (*Accipiter brevipes*)  
Sperbereule (*Sumia ulula*)  
Schneeeule (*Bubo scandiacus*)  
Blauracke<sup>6</sup> (*Coracias garrulus*)  
Blauwangensperber (*Merops persicus*)  
Rötelfalke (*Falco naumanni*)  
Eleonorenfalke (*Falco eleonorae*)  
Sakerfalke<sup>6</sup> (*Falco cherrug*)  
Wanderfalke (*Falco peregrinus*; alle Unterarten außer *peregrinus* und *calidus*)  
Gerfalke (*Falco rusticolus*)  
Isabellwürger (*Lanius isabellinus*)  
Schwarzstirnwürger<sup>6</sup> (*Lanius minor*)  
Raubwürger (*Lanius excubitor*, alle Unterarten außer *excubitor*)  
Rotkopfwürger (*Lanius senator*)  
Alpenkrähe (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)  
Alpendohle<sup>6</sup> (*Pyrrhocorax graculus*)  
Lasurmeise (*Cyanistes cyanus*)  
Weißflügellерche (*Alauda leucoptera*)  
Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*)  
Kurzzehenlerche (*Calandrella brachydactyla*)  
Bergkalenderlerche (*Melanocorypha bimaculata*)  
Kalenderlerche (*Melanocorypha calandra*)  
Schwarzsteppenlerche (*Melanocorypha yeltoniensis*)  
Turkestanlerche (*Alaudala heinei*)

Rötelschwalbe (*Cecropis daurica*)  
Seidensänger (*Cettia cetti*)  
Gelbbrauen-Laubsänger (*Phylloscopus inornatus*)  
Goldhähnchen-Laubsänger (*Phylloscopus proregulus*)  
Dunkellaubsänger (*Phylloscopus fuscatus*)  
Zilpzalp<sup>6</sup> (*Phylloscopus collybita*; nur Unterart *tristis*)  
Iberienzilpzalp (*Phylloscopus iberiae*)  
Grünlaubsänger (*Phylloscopus trochiloides*)  
Marisenrohrsänger<sup>6</sup> (*Acrocephalus melanopogon*)  
Seggenrohrsänger (*Acrocephalus paludicola*)  
Feldrohrsänger (*Acrocephalus agricola*)  
Buschrohrsänger (*Acrocephalus dumetorum*)  
Buschspötter (*Iduna caligata*)  
Blassspötter (*Iduna pallida*)  
Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)  
Zistensänger (*Cisticola juncidis*)  
Orpheusgrasmücke (*Curruca hortensis*)  
Wüstengrasmücke (*Curruca nana*)  
Samtkopf-Grasmücke (*Curruca melanocephala*)  
Balkan-Bartgrasmücke (*Curruca cantillans*)  
Rosenstar<sup>6</sup> (*Pastor roseus*)  
Erddrossel (*Zoothera aurea*)  
Schwarzkehlrossel (*Iduna atrogularis*)  
Rostflügeldrossel (*Turdus eunomus*)  
Rostschwanzdrossel (*Turdus naumanni*)  
Wanderdrossel (*Turdus migratorius*)  
Sprosser (*Luscinia luscinia*)  
Halbringsschnäpper (*Ficedula semitorquata*)  
Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*; alle Unterarten außer *gibraltariensis*)  
Steinrötel<sup>6</sup> (*Monticola saxatilis*)  
Blaumerle (*Monticola solitarius*)  
Sibirisches Schwarzkehlchen (*Saxicola maurus*)  
Isabellsteinschmätzer (*Oenanthe isabellina*)  
Wüstensteinschmätzer (*Oenanthe deserti*)  
Nonnensteinschmätzer (*Oenanthe pleschanka*)  
Balkansteinschmätzer (*Oenanthe melanoleuca*)  
Steinsperling (*Petronia petronia*)  
Schneesperling<sup>6</sup> (*Montifringilla nivalis*)  
Bergbraunelle (*Prunella montanella*)  
Schafstelze (*Motacilla flava*; alle Unterarten außer *cinereocapilla*, *feldegg*, *flava*, *thunbergi*)  
Zitronenstelze<sup>6</sup> (*Motacilla citreola*)  
Bachstelze<sup>4</sup> (*Motacilla alba*; alle Unterarten außer *alba*)  
Spornpieper (*Anthus richardi*)  
Waldpieper (*Anthus hodgsoni*)  
Strandpieper (*Anthus petrosus*)  
Hakengimpel (*Pinicola enucleator*)  
Wüstengimpel (*Bucanetes githagineus*)  
Berghänfling<sup>1</sup> (*Carduelis flavirostris*)  
Polarbirkenzeisig (*Carduelis hornemannii*)  
Kiefernkreuzschnabel (*Loxia pytyopsittacus*)  
Bindenkreuzschnabel (*Loxia leucoptera*)  
Zitronenzeisig<sup>6</sup> (*Serinus citrinella*)  
Spornammer (*Calcarius lapponicus*)  
Fichtenammer (*Emberiza leucocephala*)  
Zaunammer<sup>6</sup> (*Emberiza cirius*)  
Grauortolan (*Emberiza caesia*)  
Zwergammer (*Emberiza pusilla*)  
Waldammer (*Emberiza rustica*)  
Rötelammer (*Emberiza rutila*)  
Kappenammer (*Emberiza melanocephala*)

## Änderungen in dieser Liste (chronologisch)

### Ab 1.1.2023:

Schwarzstirnwürger sind nur noch abseits etablierter Brutgebiete (Seewinkel, Parndorfer Platte) zu melden.

### Ab 1.1.2022:

Kuhreihner und Kormorane der ssp. *carbo* werden von der Dokumentationspflicht gestrichen. Parallel zur neuen „Artenliste der Vögel Österreichs“ (Dez. 2021) wurde auch die Taxonomie dieser Liste angepasst und folgt nun der „World Bird List“ in der Fassung 11.2 des IOC (Gill et al. 2021). Nachweise des Kaiseradlers sind nur noch aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg zu melden.

**Ab 1.1.2021:** Nachweise der Unterart *graellsii* der Heringsmöwe sind künftig zu melden. Adlerbussard, Steppenweihe und Brandseeschwalbe werden von der Dokumentationspflicht gestrichen. Für Zitronenstelze und Rosenstar sind nur Meldungen in der zweiten Jahreshälfte ab 1.7. dokumentationspflichtig. Die Waldsaatgans wird neu in die Liste der dokumentationspflichtigen Arten aufgenommen.

**Ab 1.1.2020:** Nachweise von Felsenschwalbe und Alpenbraunelle werden österreichweit nicht mehr und solche des Kaiseradlers auch aus den oberösterreichischen Bezirken Perg, Linz, Linz-Land, Steyr und Steyr-Land nicht mehr behandelt. Nachweise der Großstrappe abseits des Brutgebietes bzw. des regelmäßigen Aktionsraumes sind künftig an die AFK zu melden.

**Ab 1.1.2019:** Nachweise der Zaunammer aus Niederösterreich und Wien werden nicht mehr behandelt.

**Ab 19.11.2017:** Nachweise der Weißwangengans, Zwergscharbe, Gänsegeier, Steinadler, Mornellregenfeifer und Alpensegler werden künftig nicht mehr behandelt. Räumliche Überarbeitungen der Meldepflicht betreffen (in Klammer die Region, aus denen die Meldepflicht entfällt): Zwerggans (Neusiedler See-Gebiet), Kuhreihner (Neusiedler See- und Bodensee-Gebiet), Kaiseradler (Niederösterreich), Sakerfalke (Niederösterreich mit Ausnahme des Mostviertels), Zaunammer (Wachau und Wagram, rückwirkend ab 1.1.2017 nicht zu melden).

**Ab 1.7.2016:** Nachweise der Zwergscharbe aus dem gesamten Burgenland, sowie aus den steirischen Bezirken Südstyrienmark, Leibnitz, Hartberg-Fürstenfeld, Graz und Graz Umgebung werden künftig nicht mehr behandelt. Ebenfalls fällt die Protokollpflicht für Beobachtungen des Raufußbussards aus ganz Österreich.

**Ab 8.12.2012:** Aufgrund neuer Erkenntnisse zur sicheren Bestimmung werden Nachweise aller Unterarten der Bachstelze (außer *alba*, insbesondere *yarrellii*) nur mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

**Ab 1.1.2010:** Für die folgenden Arten ist keine Dokumentation an die AFK mehr erforderlich. Für alle diese Arten wird aber ersucht, die Beobachtungen via [www.omitho.at](http://www.omitho.at) an BirdLife Österreich zu melden. Rostgans: Wildvögel können nicht mehr gesichert nachgewiesen werden (außer über Ringfunde) und alle anderen Nachweise der Kategorien C und E werden nicht von der AFK gesammelt. Bartgeier: Wildvögel können im Alpenraum aufgrund des Wiedereinbürgerungsprogrammes nicht von Vögeln der Kategorie D/E bzw. zukünftig C getrennt werden. Es wird jedoch explizit ersucht alle Meldungen von Bartgeiern auf [www.omitho.at](http://www.omitho.at) zu melden. Zwergohreule. Habichtskauz: 2009 begonnenes Aussetzungsprogramm im Wienerwald und im Dürrensteingebiet; Vögel des Aussetzungsprogrammes aus dem Böhmerwald; etabliertes Brutvorkommen in Kärnten. Doppelschnepfen müssen im Frühjahr nur mehr abseits des Neusiedler See-Gebietes an die AFK gemeldet werden (alljährlicher Durchzügler im Frühjahr). Zwergseeschwalbe. Folgende Arten wurden in die Liste der zu meldenden Arten aufgenommen bzw. bisher geltende räumliche Einschränkungen gestrichen: Sichler: nunmehr auch aus dem Neusiedler See-Gebiet an die AFK melden. Mantelmöwe: nunmehr auch aus dem Bodenseegebiet an die AFK melden. Bei beiden Arten sind die entsprechenden Nachweise derart zurückgegangen, dass eine uneingeschränkte Aufnahme in die Liste der zu meldenden Arten erforderlich ist. Raufußbussard: neu abseits der etablierten Winterverbreitungsgebiete (NÖ und N-Burgenland) an die AFK melden. Eine Durchsicht der Nachweise dieser Art abseits des genannten Raumes zeigte die Seltenheit der Art und die mangelhafte Dokumentation über Belege (Fotos). Neu nachgewiesene Unterarten: Kormoran der atlantischen Unterart *carbo* sowie Tundramöwe (*Larus fuscus heuglini*). Von letzterer werden (so wie von der Unterart *tristis* des Zilpzalps) aufgrund der ausgesprochen schwierigen Bestimmung nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

**Ab 29.11.2009:** Zwergscharben müssen rückwirkend ab 2009 aus dem Neusiedler See-Gebiet nicht mehr an die AFK gemeldet werden (etablierter Brutvogel, Mauseergast, je nach Vereisung auch im Winter anwesend).

