

Welche seltenen Vogelarten sollen an die AFK gemeldet werden?

Which bird species should be reported to the AFK?

Herausgegeben von der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich, letzte Änderung 22.4.2025
Published by the Austrian Avifaunistic Committee (AFK) of BirdLife Austria, updated 22nd April 2025



www.birdlife-afk.at

Legende

- ¹ nur Feststellungen abseits des Neusiedler See/Seewinkel.
- ² ausgenommen Beobachtungen am Frühjahrsmzug im Neusiedler See-Gebiet.
- ³ nur Feststellungen abseits des Bodenseegebietes.
- ⁴ nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung werden behandelt.
- ⁵ nur Nachweise ab dem 1. Juli.
- ⁶ nur Feststellungen abseits etablierter Brutgebiete (siehe z.B. Teufelbauer et al., Atlas der Brutvögel Österreichs, 2024), Sommer-, Zug- und Winterverbreitungsgebiete (bei Aufforderung nach Eingabe auf ornitho.at).
- ⁷ nur sofern angenommen wird, dass es sich um Wildvögel und nicht um freigesetzte, entkommene bzw. verwilderte Vögel handelt. Neben der Beschreibung des Vogels sind vor allem die Beobachtungsumstände, die zu dieser Annahme führten, zu detaillieren.
- ⁸ nur Feststellungen von Vögeln deren Herkunft gesichert ist (z.B. durch Beringung).
- ⁹ nur Feststellungen aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg.

Allgemeines

Die letzten Änderungen finden sich auf Seite 2. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, wenn Arten nach Revisionen von der österreichischen Artenliste gestrichen wurden oder durch anerkannte Erstnachweise neue Arten hinzugekommen sind. Außerdem erfolgen Aktualisierungen, um systematische und taxonomische Änderungen in der österreichischen Artenliste zu übernehmen. Die folgende Liste jener Arten bzw. Unterarten, die an die Avifaunistische Kommission (mittels des Online-Meldeformulars auf www.birdlife-afk.at) gemeldet werden sollen, enthält nur Arten, die bisher als Wildvögel oder aus verwilderten Populationen stammend in Österreich nachgewiesen worden sind. Zusätzlich sind Beobachtungen von Arten oder Unterarten, die bisher noch nicht in Österreich als Wildvogel festgestellt worden sind und bei denen ein Auftreten als Wildvogel vermutet wird an die AFK zu melden.

Ringelgans (<i>Branta bernicla</i>)	Dreizehenmöwe (<i>Rissa tridactyla</i>)	Rötelschwalbe (<i>Cecropis daurica</i>)
Rothsängers ^{1, 7} (<i>Branta ruficollis</i>)	Schwalbenmöwe (<i>Xema sabini</i>)	Seidensänger (<i>Cettia cetti</i>)
Waldsaatgans (<i>Anser fabalis</i>)	Lachseeschwalbe (<i>Gelochelidon nilotica</i>)	Gelbbräuen-Laubsänger (<i>Phylloscopus inornatus</i>)
Kurzschwanzgans (<i>Anser brachyrhynchus</i>)	Rüppellseeschwalbe (<i>Thalasseus bengalensis</i>)	Goldhähnchen-Laubsänger (<i>Phylloscopus proregulus</i>)
Blässgans (<i>Anser albifrons</i> ; alle ssp. außer <i>albifrons</i>)	Rosenseeschwalbe (<i>Sterna dougalli</i>)	Dunkellaubsänger (<i>Phylloscopus fuscatus</i>)
Zwerggans ¹ (<i>Anser erythropus</i>)	Küstenseeschwalbe (<i>Sterna paradisaea</i>)	Zilpzalp ⁴ (<i>Phylloscopus collybita</i> ; nur Unterart <i>tristis</i>)
Zwergschwan ³ (<i>Cygnus columbianus</i>)	Skua (<i>Stercorarius skua</i>)	Iberienzilpzalp (<i>Phylloscopus iberiae</i>)
Blaufügelente (<i>Spatula discors</i>)	Spatelraubmöwe (<i>Stercorarius pomarinus</i>)	Grünlaubsänger (<i>Phylloscopus trochiloides</i>)
Sichelente (<i>Mareca falcata</i>)	Schmarotzeraubmöwe (<i>Stercorarius parasiticus</i>)	Mariskenrohrsänger ⁶ (<i>Acrocephalus melanopogon</i>)
Nordamerikanische Pfeifente (<i>Mareca americana</i>)	Falkenraubmöwe (<i>Stercorarius longicaudus</i>)	Seggenrohrsänger (<i>Acrocephalus paludicola</i>)
Amerikanische Krickente (<i>Anas carolinensis</i>)	Krabbentaucher (<i>Alle alle</i>)	Feldrohrsänger (<i>Acrocephalus agricola</i>)
Ringschnabelente (<i>Aythya collaris</i>)	Dickschnabellumme (<i>Uria lomvia</i>)	Buschrohrsänger (<i>Acrocephalus dumetorum</i>)
Kragente (<i>Histrionicus histrionicus</i>)	Trottellumme (<i>Uria aalge</i>)	Buschspötter (<i>Iduna caligata</i>)
Schwarzkopf-Ruderente (<i>Syrhaptes paradoxus</i>)	Tordalk (<i>Alca torda</i>)	Blassspötter (<i>Iduna pallida</i>)
Weißkopf-Ruderente (<i>Oxyura leucocephala</i>)	Papageitaucher (<i>Fregata aegialia</i>)	Orpheusspötter (<i>Hippoboscus polyglotta</i>)
Steinhuhn ⁸ (<i>Alectoris graeca</i>)	Eistaucher (<i>Gavia immer</i>)	Zistensänger (<i>Cisticola juncidis</i>)
Fahlsegler (<i>Apus pallidus</i>)	Gelbschnabeltaucher (<i>Gavia adamsii</i>)	Orpheusgrasmücke (<i>Currucula hortensis</i>)
Großtrappe ⁸ (<i>Otis tarda</i>)	Sturmwellenläufer (<i>Hydrobates pelagicus</i>)	Wüstengrasmücke (<i>Currucula nana</i>)
Steppenkrantappe (<i>Chlamydotis macqueenii</i>)	Wellenläufer (<i>Hydrobates leucorhous</i>)	Samtkopf-Grasmücke (<i>Currucula melanocephala</i>)
Zwergtrappe (<i>Tetrax tetrax</i>)	Sepiasturtaucher (<i>Calonectris diomedea</i>)	Balkan-Bartgrasmücke (<i>Currucula cantillans</i>)
Häherkuckuck (<i>Clamator glandarius</i>)	Mittelmeer-Sturmtaucher (<i>Puffinus yelkouan</i>)	Rosenstar ⁹ (<i>Pastor roseus</i>)
Steppenflughuhn (<i>Syrhaptes paradoxus</i>)	Basstöpel (<i>Morus bassanus</i>)	Erddrossel (<i>Zoothera aurea</i>)
Orientturteltaube (<i>Streptopelia orientalis</i>)	Krähenscharbe (<i>Gulosus aristotelis</i>)	Schwarzkehlrossel (<i>Turdus atrogularis</i>)
Purpurhuhn (<i>Porphyrio porphyrio</i>)	Heiliger Ibis ⁷ (<i>Threskiornis aethiopicus</i>)	Rostflügelrossel (<i>Turdus eunomus</i>)
Zwergsumpfhuhn (<i>Zapornia pusilla</i>)	Sichler (<i>Plegadis falcinellus</i>)	Rostschwanzrossel (<i>Turdus naumanni</i>)
Jungfernkranich (<i>Grus virgo</i>)	Rosapelikan (<i>Pelecanus onocrotalus</i>)	Wanderdrossel (<i>Turdus migratorius</i>)
Rosafleming (<i>Phoenicurus roseus</i>)	Krauskopfpelikan (<i>Pelecanus crispus</i>)	Sprossler (<i>Luscinia luscinia</i>)
Steppenkiebitz (<i>Vanellus gregarius</i>)	Gleitär (<i>Elanus caeruleus</i>)	Halbringschnäpper (<i>Ficedula semitorquata</i>)
Weißschwanzkiebitz (<i>Vanellus leucurus</i>)	Schmutzgeier (<i>Neophron percnopterus</i>)	Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros</i> ; alle Unterarten außer <i>gibraltariensis</i>)
Pazifischer Goldregenpfeifer (<i>Pluvialis fulva</i>)	Mönchsgeier (<i>Aegypius monachus</i>)	Steinrötel ⁶ (<i>Monticola saxatilis</i>)
Amerikanischer Goldregenpfeifer (<i>Pluvialis dominica</i>)	Schlangenadler (<i>Circus cyaneus</i>)	Blaumerle (<i>Monticola solitarius</i>)
Seereggenpfeifer ^{1,3} (<i>Charadrius alexandrinus</i>)	Schreiadler (<i>Clanga pomarina</i>)	Sibirischer Schwarzkehlchen (<i>Saxicola maurus</i>)
Wüstenregenpfeifer (<i>Charadrius leschenaultii</i>)	Schelladler (<i>Clanga clanga</i>)	Isabellsteinschmätzer (<i>Oenanthe isabellina</i>)
Dünnschnabel-Brachvogel (<i>Numenius tenuirostris</i>)	Zwergadler (<i>Aquila pennata</i>)	Wüstensteinschmätzer (<i>Oenanthe deserti</i>)
Uferschnepfe (<i>Limosa limosa</i> ; alle Unterarten außer <i>limosa</i>)	Steppenadler (<i>Aquila nipalensis</i>)	Nonnensteinschmätzer (<i>Oenanthe pleschanka</i>)
Sumpfläufer ¹ (<i>Calidris falcinellus</i>)	Kaiseradler ⁹ (<i>Aquila heliaca</i>)	Balkansteinschmätzer (<i>Oenanthe melanoleuca</i>)
Weißbürzel-Strandläufer (<i>Calidris fuscicollis</i>)	Habichtsadler (<i>Aquila fasciata</i>)	Steinsperling (<i>Petronia petronia</i>)
Grasläufer (<i>Calidris subruficollis</i>)	Kurzfangsperber (<i>Accipiter brevipes</i>)	Schneesperring ⁶ (<i>Montifringilla nivalis</i>)
Bairdstrandläufer (<i>Calidris bairdii</i>)	Sperbergule (<i>Sumia ulula</i>)	Bergbraunelle (<i>Prunella montanella</i>)
Graubrust-Strandläufer (<i>Calidris melanotos</i>)	Schneeeule (<i>Bubo scandiacus</i>)	Schafstelze (<i>Motacilla flava</i> ; alle Unterarten außer <i>cinereocapilla</i> , <i>feldegg</i> , <i>flava</i> , <i>thunbergi</i>)
Sandstrandläufer (<i>Calidris pusilla</i>)	Blauracke ⁶ (<i>Coracias garrulus</i>)	Zitronenstelze ⁶ (<i>Motacilla citreola</i>)
Meerstrandläufer (<i>Calidris maritima</i>)	Blauwangenspint (<i>Merops persicus</i>)	Bachstelze ⁴ (<i>Motacilla alba</i> ; alle Unterarten außer <i>alba</i>)
Spitzschwanz-Strandläufer (<i>Calidris acuminata</i>)	Rötelfalke (<i>Falco naumanni</i>)	Spornpieper (<i>Anthus richardi</i>)
Doppelschnepfe ² (<i>Gallinago media</i>)	Eleonorenfalke (<i>Falco eleonorae</i>)	Waldpieper (<i>Anthus hodgsoni</i>)
Terekwasserläufer (<i>Xenus cinereus</i>)	Sakerfalke ⁶ (<i>Falco cherrug</i>)	Strandpieper (<i>Anthus petrosus</i>)
Thorshühnchen (<i>Phalaropus fulicarius</i>)	Wanderfalke (<i>Falco peregrinus</i> ; alle Unterarten außer <i>peregrinus</i> und <i>calidus</i>)	Hakengimpel (<i>Pinnicola enucleator</i>)
Drosseluferläufer (<i>Actitis macularius</i>)	Gerfalke (<i>Falco rusticolus</i>)	Wüstengimpel (<i>Bucanetes githagineus</i>)
Kleiner Gelbschenkel (<i>Tringa flavipes</i>)	Isabellwürger (<i>Lanius isabellinus</i>)	Berghänfling ¹ (<i>Carduelis flavirostris</i>)
Rennvogel (<i>Cursorius cursor</i>)	Schwarzstirnwürger ⁶ (<i>Lanius minor</i>)	Polarbirkenzeisig (<i>Carduelis hornemanni</i>)
Rotflügel-Brachschwalbe (<i>Glareola pratincola</i>)	Raubwürger (<i>Lanius excubitor</i> ; alle Unterarten außer <i>excubitor</i>)	Kiefernkreuzschnabel (<i>Loxia pytyopsittacus</i>)
Schwarzflügel-Brachschwalbe (<i>Glareola nordmanni</i>)	Rotkopfwürger (<i>Lanius senator</i>)	Bindenkreuzschnabel (<i>Loxia leucoptera</i>)
Dünnschnabelmöwe (<i>Chroicocephalus genei</i>)	Alpenkrähe (<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>)	Zitronenzeisig ⁶ (<i>Serinus citrinella</i>)
Präriemöwe (<i>Leucophaea pipixcan</i>)	Alpendohle ⁶ (<i>Pyrrhocorax graculus</i>)	Spornammer (<i>Calcarius lapponicus</i>)
Fischmöwe (<i>Ichthyophaga ichthyophaga</i>)	Lasurmeise (<i>Cyanistes cyaneus</i>)	Fichtenammer (<i>Emberiza leucocephala</i>)
Korallenmöwe (<i>Ichthyophaga audouinii</i>)	Weißflügelgellerche (<i>Alauda leucoptera</i>)	Zaunammer ⁶ (<i>Emberiza cirius</i>)
Sturmmöwe (<i>Larus canus</i> ; nur Unterart <i>heinei</i>)	Ohrenlerche (<i>Eremophila alpestris</i>)	Grauortolan (<i>Emberiza caesia</i>)
Ringschnabelmöwe (<i>Larus delawarensis</i>)	Kurzzeilenlerche (<i>Calandrella brachydactyla</i>)	Zwergammer (<i>Emberiza pusilla</i>)
Mantelmöwe (<i>Larus marinus</i>)	Bergkalanderlerche (<i>Melanocorypha bimaculata</i>)	Waldammer (<i>Emberiza rustica</i>)
Eismöwe (<i>Larus hyperboreus</i>)	Kalanderlerche (<i>Melanocorypha calandra</i>)	Rötelammer (<i>Emberiza rutila</i>)
Polarmöwe (<i>Larus glaucoides</i>)	Schwarzsteppenlerche (<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>)	Kappenammer (<i>Emberiza melanocephala</i>)
Heringsmöwe (<i>Larus fuscus</i> ; nur Unterarten <i>graellsii</i> ⁹ und <i>heuglini</i> ⁹)	Turkestanlerche (<i>Alauda heinei</i>)	

Änderungen in dieser Liste (chronologisch)

Ab 1.1.2023:

Schwarzstirnwürger sind nur noch abseits etablierter Brutgebiete (Seewinkel, Parndorfer Platte) zu melden.

Ab 1.1.2022:

Kuhreihner und Kormorane der ssp. *carbo* werden von der Dokumentationspflicht gestrichen. Parallel zur neuen „Artenliste der Vögel Österreichs“ (Dez. 2021) wurde auch die Taxonomie dieser Liste angepasst und folgt nun der „World Bird List“ in der Fassung 11.2 des IOC (Gill et al. 2021). Nachweise des Kaiseradlers sind nur noch aus Salzburg, Tirol und Vorarlberg zu melden.

Ab 1.1.2021: Nachweise der Unterart *graellsii* der Heringsmöwe sind künftig zu melden. Adlerbussard, Steppenweihe und Brandseeschwalbe werden von der Dokumentationspflicht gestrichen. Für Zitronenstelze und Rosenstar sind nur Meldungen in der zweiten Jahreshälfte ab 1.7. dokumentationspflichtig. Die Waldsaatgans wird neu in die Liste der dokumentationspflichtigen Arten aufgenommen.

Ab 1.1.2020: Nachweise von Felsenschwalbe und Alpenbraunelle werden österreichweit nicht mehr und solche des Kaiseradlers auch aus den oberösterreichischen Bezirken Perg, Linz, Linz-Land, Steyr und Steyr-Land nicht mehr behandelt. Nachweise der Großstrappe abseits des Brutgebietes bzw. des regelmäßigen Aktionsraumes sind künftig an die AFK zu melden.

Ab 1.1.2019: Nachweise der Zaunammer aus Niederösterreich und Wien werden nicht mehr behandelt.

Ab 19.11.2017: Nachweise der Weißwangengans, Zwergscharbe, Gänsegeier, Steinadler, Mornellregenfeifer und Alpensegler werden künftig nicht mehr behandelt. Räumliche Überarbeitungen der Meldepflicht betreffen (in Klammer die Region, aus denen die Meldepflicht entfällt): Zwerggans (Neusiedler See-Gebiet), Kuhreihner (Neusiedler See- und Bodensee-Gebiet), Kaiseradler (Niederösterreich), Sakerfalke (Niederösterreich mit Ausnahme des Mostviertels), Zaunammer (Wachau und Wagram, rückwirkend ab 1.1.2017 nicht zu melden).

Ab 1.7.2016: Nachweise der Zwergscharbe aus dem gesamten Burgenland, sowie aus den steirischen Bezirken Südstyrienmark, Leibnitz, Hartberg-Fürstenfeld, Graz und Graz Umgebung werden künftig nicht mehr behandelt. Ebenfalls fällt die Protokollpflicht für Beobachtungen des Raufußbussards aus ganz Österreich.

Ab 8.12.2012: Aufgrund neuer Erkenntnisse zur sicheren Bestimmung werden Nachweise aller Unterarten der Bachstelze (außer *alba*, insbesondere *yarrellii*) nur mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

Ab 1.1.2010: Für die folgenden Arten ist keine Dokumentation an die AFK mehr erforderlich. Für alle diese Arten wird aber ersucht, die Beobachtungen via www.omitho.at an BirdLife Österreich zu melden. Rostgans: Wildvögel können nicht mehr gesichert nachgewiesen werden (außer über Ringfunde) und alle anderen Nachweise der Kategorien C und E werden nicht von der AFK gesammelt. Bartgeier: Wildvögel können im Alpenraum aufgrund des Wiedereinbürgerungsprogrammes nicht von Vögeln der Kategorie D/E bzw. zukünftig C getrennt werden. Es wird jedoch explizit ersucht alle Meldungen von Bartgeiern auf www.omitho.at zu melden. Zwergohreule. Habichtskauz: 2009 begonnenes Aussetzungsprogramm im Wienerwald und im Dürrensteingebiet; Vögel des Aussetzungsprogrammes aus dem Böhmerwald; etabliertes Brutvorkommen in Kärnten. Doppelschnepfen müssen im Frühjahr nur mehr abseits des Neusiedler See-Gebietes an die AFK gemeldet werden (alljährlicher Durchzügler im Frühjahr). Zwergseeschwalbe. Folgende Arten wurden in die Liste der zu meldenden Arten aufgenommen bzw. bisher geltende räumliche Einschränkungen gestrichen: Sichler: nunmehr auch aus dem Neusiedler See-Gebiet an die AFK melden. Mantelmöwe: nunmehr auch aus dem Bodenseegebiet an die AFK melden. Bei beiden Arten sind die entsprechenden Nachweise derart zurückgegangen, dass eine uneingeschränkte Aufnahme in die Liste der zu meldenden Arten erforderlich ist. Raufußbussard: neu abseits der etablierten Winterverbreitungsgebiete (NÖ und N-Burgenland) an die AFK melden. Eine Durchsicht der Nachweise dieser Art abseits des genannten Raumes zeigte die Seltenheit der Art und die mangelhafte Dokumentation über Belege (Fotos). Neu nachgewiesene Unterarten: Kormoran der atlantischen Unterart *carbo* sowie Tundramöwe (*Larus fuscus heuglini*). Von letzterer werden (so wie von der Unterart *tristis* des Zilpzalps) aufgrund der ausgesprochen schwierigen Bestimmung nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

Ab 29.11.2009: Zwergscharben müssen rückwirkend ab 2009 aus dem Neusiedler See-Gebiet nicht mehr an die AFK gemeldet werden (etablierter Brutvogel, Mauseergast, je nach Vereisung auch im Winter anwesend).



Spezielle Kriterien zur Anerkennung

Sofern Beobachtungen nicht durch gesicherte Zusatzinformation wie DNA-Abgleich oder Ringfunde unterstützt werden, gelten für die folgende Unterarten gesonderte Anforderungen.

"Atlantischer Kormoran" (*Phalacrocorax carbo carbo*)

"Tundramöwe" (*Larus fuscus heuglini*)

Heringsmöwe ssp. *graellsii* (*Larus fuscus graellsii*)

"Taigazilpzalp" (*Phylloscopus collybita tristis*)

"Trauerbachstelze" (*Motacilla alba yarrellii*)