

# Welche seltenen Vogelarten sollen an die AFK gemeldet werden?

## Which bird species should be reported to the AFK?

Herausgegeben von der Avifaunistischen Kommission von BirdLife Österreich

Published by the Austrian Avifaunistic Committee (AFK) of BirdLife Austria



www.birdlife-afk.at

Letzte Änderung/updated: 28.4.2021

### Allgemeines

Die letzten Änderungen finden sich auf Seite 2. Die Liste wird regelmäßig aktualisiert, wenn Arten nach Revisionen von der österreichischen Artenliste gestrichen wurden oder durch anerkannte Erstnachweise neue Arten hinzugekommen sind. Außerdem erfolgen Aktualisierungen, um systematische und taxonomische Änderungen in der österreichischen Artenliste zu übernehmen. Die folgende Liste jener Arten bzw. Unterarten, die an die Avifaunistische Kommission (mittels des Online-Meldeformulars auf [www.birdlife-afk.at](http://www.birdlife-afk.at)) gemeldet werden sollen, enthält nur Arten, die bisher als Wildvögel oder aus verwilderten Populationen stammend in Österreich nachgewiesen worden sind. Zusätzlich sind Beobachtungen von Arten oder Unterarten, die bisher noch nicht in Österreich als Wildvogel festgestellt worden sind und bei denen ein Auftreten als Wildvogel vermutet wird an die AFK zu melden.

### Legende

- <sup>1</sup> nur Feststellungen abseits des Neusiedler See/Seewinkel.
- <sup>2</sup> ausgenommen Beobachtungen am Frühjahrszug im Neusiedler See-Gebiet.
- <sup>3</sup> nur Feststellungen abseits des Bodenseegebietes.
- <sup>4</sup> nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung werden behandelt.
- <sup>5</sup> nur Nachweise ab dem 1. Juli.
- <sup>6</sup> nur Feststellungen abseits der etablierten Brutgebiete (siehe z.B. Dvorak et al., Atlas der Brutvögel Österreichs, 1993), Sommer-, Zug- und Winterverbreitungsgebiete (bei Aufforderung nach Eingabe auf [ornitho.at](http://ornitho.at)).
- <sup>7</sup> nur sofern angenommen wird, dass es sich um Wildvögel und nicht um freigesetzte, entkommene bzw. verwilderte Vögel handelt. Neben der Beschreibung des Vogels sind vor allem die Beobachtungsbedingungen, die zu dieser Annahme führten, zu detaillieren.
- <sup>8</sup> nur Feststellungen von Vögeln deren Herkunft gesichert ist (z.B. durch Beringung).

Zwergschwan<sup>3</sup> (*Cygnus columbianus*)  
 Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchus*)  
 Waldsaatgans (*Anser fabalis*)  
 Blässgans (*Anser albifrons*; alle ssp. außer *albifrons*)  
 Zwerggans<sup>1</sup> (*Anser erythropus*)  
 Ringelgans (*Branta bernicla*)  
 Rothalsgans<sup>1,7</sup> (*Branta ruficollis*)  
 Nordamerikanische Pfeifente (*Anas americana*)  
 Sichelente (*Anas falcata*)  
 Amerikanische Krickente (*Anas carolinensis*)  
 Blauflügelente (*Anas discors*)  
 Ringschnabelente (*Aythya collaris*)  
 Kragenente (*Histrionicus histrionicus*)  
 Schwarzkopf-Ruderente (*Oxyura jamaicensis*)  
 Weißkopf-Ruderente (*Oxyura leucocephala*)  
 Steinhuhn<sup>6</sup> (*Alectoris graeca*)  
 Eistaucher (*Gavia immer*)  
 Gelbschnabeltaucher (*Gavia adamsii*)  
 Sepiasturmtaucher (*Calonectris diomedea*)  
 Mittelmeer-Sturmtaucher (*Puffinus yelkouan*)  
 Sturmschwalbe (*Hydrobates pelagicus*)  
 Wellenläufer (*Oceanodroma leucorhoa*)  
 Basstöpel (*Morus bassanus*)  
 Kormoran (*Phalacrocorax carbo*; nur Unterart *carbo*)  
 Krähenscharbe (*Phalacrocorax aristotelis*)  
 Rosapelikan (*Pelecanus onocrotalus*)  
 Krauskopfpelikan (*Pelecanus crispus*)  
 Kuhreiher<sup>1,3</sup> (*Bubulcus ibis*)  
 Sichler (*Plegadis falcinellus*)  
 Heiliger Ibis<sup>7</sup> (*Threskiornis aethiopicus*)  
 Rosaflemming (*Phoenicopterus roseus*)  
 Gleitaar (*Elanus caeruleus*)  
 Schmutzgeier (*Neophron percnopterus*)  
 Mönchsgeier (*Aegypius monachus*)  
 Schlangennadler (*Circaetus gallicus*)  
 Kurzfangsperber (*Accipiter brevipes*)  
 Schreiadler (*Aquila pomarina*)  
 Schelladler (*Aquila clanga*)  
 Kaiseradler<sup>6</sup> (*Aquila heliaca*)  
 Steppenadler (*Aquila nipalensis*)  
 Zwergadler (*Aquila pennata*)  
 Habichtsadler (*Aquila fasciata*)  
 Rötelfalke (*Falco naumanni*)  
 Eleonorenfalke (*Falco eleonorae*)  
 Sakerfalke<sup>6</sup> (*Falco cherrug*)  
 Gerfalke (*Falco rusticolus*)  
 Zwergsumpfhuhn (*Porzana pusilla*)  
 Purpurhuhn (*Porphyrio porphyrio*)  
 Zwergtrappe (*Tetrax tetrax*)  
 Großtrappe<sup>6</sup> (*Otis tarda*)  
 Steppenkrägentrappe (*Chlamydotis macqueenii*)  
 Jungfernkranich (*Anthropoides virgo*)  
 Rennvogel (*Cursorius cursor*)  
 Rotflügel-Brachschwalbe (*Glaucola pratincta*)  
 Schwarzflügel-Brachschwalbe (*Glaucola nordmanni*)  
 Seeregenpfeifer<sup>1,3</sup> (*Charadrius alexandrinus*)  
 Wüstenregenpfeifer (*Charadrius leschenaultii*)  
 Pazifischer Goldregenpfeifer (*Pluvialis fulva*)  
 Amerikanischer Goldregenpfeifer (*Pluvialis dominica*)  
 Steppenkiebitz (*Vanellus gregarius*)

Weißschwanzkiebitz (*Vanellus leucurus*)  
 Weißbüchel-Strandläufer (*Calidris fuscicollis*)  
 Bairdstrandläufer (*Calidris bairdii*)  
 Graubrust-Strandläufer (*Calidris melanotos*)  
 Sandstrandläufer (*Calidris pusilla*)  
 Spitzschwanz-Strandläufer (*Calidris acuminata*)  
 Meerstrandläufer (*Calidris maritima*)  
 Sumpfläufer<sup>1</sup> (*Limicola falcinellus*)  
 Grasiäuler (*Tryngites subruficollis*)  
 Doppelschnepfe<sup>2</sup> (*Gallinago media*)  
 Dünnschnabel-Brachvogel (*Numenius tenuirostris*)  
 Terekwasserläufer (*Xenus cinereus*)  
 Drosselufeläuler (*Actitis macularia*)  
 Kleiner Gelbschenkel (*Tringa flavipes*)  
 Thorshühnchen (*Phalaropus fulicarius*)  
 Spatelaubmöwe (*Stercorarius pomarinus*)  
 Schmarotzeraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*)  
 Falkenraubmöwe (*Stercorarius longicaudus*)  
 Skua (*Stercorarius skua*)  
 Fischmöwe (*Larus ichthyaetus*)  
 Präriemöwe (*Larus pipixcan*)  
 Dünnschnabelmöwe (*Larus genei*)  
 Ringschnabelmöwe (*Larus delawarensis*)  
 Heringsmöwe (*Larus fuscus*; nur Unterarten *graellsii*<sup>8</sup> und *heuglini*<sup>8</sup>)  
 Polarmöwe (*Larus glaucooides*)  
 Eismöwe (*Larus hyperboreus*)  
 Mantelmöwe (*Larus marinus*)  
 Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*)  
 Schwalbenmöwe (*Xema sabini*)  
 Lachseeschwalbe (*Gelochelidon nilotica*)  
 Rüppellseeschwalbe (*Sterna bergalensis*)  
 Rosenseeschwalbe (*Sterna dougalli*)  
 Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*)  
 Dickschnabellumme (*Uria lomvia*)  
 Tordalk (*Alca torda*)  
 Trottellumme (*Uria aalge*)  
 Krabbentaucher (*Alle alle*)  
 Papageitaucher (*Fratercula arctica*)  
 Steppenflughuhn (*Syrhaptes paradoxus*)  
 Orienturtaube (*Streptopelia orientalis*)  
 Häherkuckuck (*Clamator glandarius*)  
 Schnee-Eule (*Bubo scandiaca*)  
 Spereule (*Sumia ulula*)  
 Blauracke<sup>6</sup> (*Coracias garrulus*)  
 Blauwangenspint (*Merops persicus*)  
 Kalandlerlerche (*Melanocorypha calandra*)  
 Weißflügellerche (*Melanocorypha leucoptera*)  
 Mohrenlerche (*Melanocorypha yeltoniensis*)  
 Kurzzehenlerche (*Calandrella brachydactyla*)  
 Stummellerche (*Calandrella rufescens*)  
 Ohrenlerche (*Eremophila alpestris*)  
 Rötelschwalbe (*Cecropis daurica*)  
 Spornpieper (*Anthus richardi*)  
 Waldpieper (*Anthus hodgsoni*)  
 Strandpieper (*Anthus petrosus*)  
 Schafstelze (*Motacilla flava*; alle Unterarten außer *cinereocapilla*, *feldegg*, *flava*, *thunbergi*)  
 Zitronenstelze<sup>5</sup> (*Motacilla citreola*)  
 Bachstelze<sup>4</sup> (*Motacilla alba*; alle Unterarten außer *alba*)

Bergbraunelle (*Prunella montanella*)  
 Sprosser (*Luscinia luscinia*)  
 Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*; alle Unterarten außer *gibraltariensis*)  
 Sibirisches Schwarzkehlchen (*Saxicola maurus*)  
 Isabellsteinschmätzer (*Oenanthe isabellina*)  
 Nonnensteinschmätzer (*Oenanthe pleschanka*)  
 Mittelmeer-Steinschmätzer (*Oenanthe hispanica*)  
 Wüstensteinschmätzer (*Oenanthe deserti*)  
 Steinrötel<sup>6</sup> (*Monticola saxatilis*)  
 Blaumerle (*Monticola solitarius*)  
 Erddrossel (*Zoothera dauma*)  
 Rostschwanzdrossel (*Turdus naumanni*)  
 Rostflügeldrossel (*Turdus eunomus*)  
 Schwarzkehldrossel (*Turdus atrogularis*)  
 Wanderdrossel (*Turdus migratorius*)  
 Seidensänger (*Cettia cetti*)  
 Cistensänger (*Cisticola juncidis*)  
 Buschspötter (*Iduna caligata*)  
 Blassspötter (*Iduna pallida*)  
 Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)  
 Mariskensänger<sup>6</sup> (*Acrocephalus melanopogon*)  
 Seggenrohrsänger (*Acrocephalus paludicola*)  
 Feldrohrsänger (*Acrocephalus agricola*)  
 Buschrohrsänger (*Acrocephalus dumetorum*)  
 Weißbart-Grasmücke (*Sylvia cantillans*)  
 Samtkopf-Grasmücke (*Sylvia melanocephala*)  
 Orpheusgrasmücke (*Sylvia hortensis*)  
 Grünlaubsänger (*Phylloscopus trochiloides*)  
 Goldhähnchen-Laubsänger (*Phylloscopus proregulus*)  
 Gelbbrauen-Laubsänger (*Phylloscopus inornatus*)  
 Dunkellaubsänger (*Phylloscopus fuscatus*)  
 Zilpzalp<sup>6</sup> (*Phylloscopus collybita*; nur Unterart *tristis*)  
 Halbringschnäpper (*Ficedula semitorquata*)  
 Lasurmeise (*Parus cyanus*)  
 Isabellwürger (*Lanius isabellinus*)  
 Schwarzstirnwürger (*Lanius minor*)  
 Raubwürger (*Lanius excubitor*; alle Unterarten außer *excubitor*)  
 Rotkopfwürger (*Lanius senator*)  
 Alpendohle<sup>6</sup> (*Pyrrhocorax graculus*)  
 Alpenkrähe (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)  
 Rosenstar<sup>6</sup> (*Pastor roseus*)  
 Steinsperling (*Petronia petronia*)  
 Schneesperling<sup>6</sup> (*Montifringilla nivalis*)  
 Zitronengirlitz<sup>2</sup> (*Serinus citrinella*)  
 Berghänfling<sup>1</sup> (*Carduelis flavirostris*)  
 Polarbirkenzeisig (*Carduelis homemanni*)  
 Bindenkreuzschnabel (*Loxia leucoptera*)  
 Kiefernkreuzschnabel (*Loxia pytyopsittacus*)  
 Wüstengimpel (*Bucanetes githagineus*)  
 Hakengimpel (*Pinicola enucleator*)  
 Spornammer (*Calcarius lapponicus*)  
 Fichtenammer (*Emberiza leucocephalos*)  
 Zaunammer<sup>6</sup> (*Emberiza cirlus*)  
 Grauortolan (*Emberiza caesia*)  
 Waldammer (*Emberiza rustica*)  
 Zwergammer (*Emberiza pusilla*)  
 Kappenammer (*Emberiza melanocephala*)

## Änderungen in dieser Liste (chronologisch)

**Ab 1.1.2021:** Nachweise der Unterart *graellsii* der Heringsmöwe sind künftig zu melden. Adlerbussard, Steppenweih und Brandseeschwalbe werden von der Dokumentationspflicht gestrichen. Für Zitronenstelze und Rosenstar sind nur Meldungen in der zweiten Jahreshälfte ab 1.7. dokumentationspflichtig. Die Waldsaatgans wird neu in die Liste der dokumentationspflichtigen Arten aufgenommen.



**Ab 1.1.2020:** Nachweise von Felsenschwalbe und Alpenbraunelle werden österreichweit nicht mehr und solche des Kaiseradlers auch aus den oberösterreichischen Bezirken Perg, Linz, Linz-Land, Steyr und Steyr-Land nicht mehr behandelt. Nachweise der Großtrappe abseits des Brutgebietes bzw. des regelmäßigen Aktionsraumes sind künftig an die AFK zu melden.

**Ab 1.1.2019:** Nachweise der Zaunammer aus Niederösterreich und Wien werden nicht mehr behandelt.

**Ab 19.11.2017:** Nachweise der Weißwangengans, Zwergscharbe, Gänsegeier, Steinadler, Mornellregenpfeifer und Alpensegler werden künftig nicht mehr behandelt. Räumliche Überarbeitungen der Meldepflicht betreffen (in Klammer die Region, aus denen die Meldepflicht entfällt): Zwerggans (Neusiedler See-Gebiet), Kuhreiher (Neusiedler See- und Bodensee-Gebiet), Kaiseradler (Niederösterreich), Sakerfalke (Niederösterreich mit Ausnahme des Mostviertels), Zaunammer (Wachau und Wagram, rückwirkend ab 1.1.2017 nicht zu melden).

**Ab 1.7.2016:** Nachweise der Zwergscharbe aus dem gesamten Burgenland, sowie aus den steirischen Bezirken Südsteiermark, Leibnitz, Hartberg-Fürstenfeld, Graz und Graz Umgebung werden künftig nicht mehr behandelt. Ebenfalls fällt die Protokollpflicht für Beobachtungen des Raufußbussards aus ganz Österreich.

**Ab 8.12.2012:** Aufgrund neuer Erkenntnisse zur sicheren Bestimmung werden Nachweise aller Unterarten der Bachstelze (außer *alba*, insbesondere *yarrellii*) nur mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

**Ab 1.1.2010:** Für die folgenden Arten ist keine Dokumentation an die AFK mehr erforderlich. Für alle diese Arten wird aber ersucht, die Beobachtungen via [www.ornitho.at](http://www.ornitho.at) an BirdLife Österreich zu melden. Rostgans: Wildvögel können nicht mehr gesichert nachgewiesen werden (außer über Ringfunde) und alle anderen Nachweise der Kategorien C und E werden nicht von der AFK gesammelt. Bartgeier: Wildvögel können im Alpenraum aufgrund des Wiedereinbürgerungsprogrammes nicht von Vögeln der Kategorie D/E bzw. zukünftig C getrennt werden. Es wird jedoch explizit ersucht alle Meldungen von Bartgeiern auf [www.ornitho.at](http://www.ornitho.at) zu melden. Zwergohreule. Habichtskauz: 2009 begonnenes Aussetzungsprogramm im Wienerwald und im Dürrensteingebiet; Vögel des Aussetzungsprogrammes aus dem Böhmerwald; etabliertes Brutvorkommen in Kärnten. Doppelschnepfen müssen im Frühjahr nur mehr abseits des Neusiedler See-Gebietes an die AFK gemeldet werden (alljährlicher Durchzügler im Frühjahr). Zwergseeschwalbe. Folgende Arten wurden in die Liste der zu meldenden Arten aufgenommen bzw. bisher geltende räumliche Einschränkungen gestrichen: Sichler: nunmehr auch aus dem Neusiedler See-Gebiet an die AFK melden. Mantelmöwe: nunmehr auch aus dem Bodenseegebiet an die AFK melden. Bei beiden Arten sind die entsprechenden Nachweise derart zurückgegangen, dass eine uneingeschränkte Aufnahme in die Liste der zu meldenden Arten erforderlich ist. Raufußbussard: neu abseits der etablierten Winterverbreitungsgebiete (NÖ und N-Burgenland) an die AFK melden. Eine Durchsicht der Nachweise dieser Art abseits des genannten Raumes zeigte die Seltenheit der Art und die mangelhafte Dokumentation über Belege (Fotos). Neu nachgewiesene Unterarten: Kormoran der atlantischen Unterart *carbo* sowie Tundramöwe (*Larus fuscus heuglini*). Von letzterer werden (so wie von der Unterart *tristis* des Zilpzalps) aufgrund der ausgesprochen schwierigen Bestimmung nur Nachweise mit guten Fotos & unterstützender Beschreibung behandelt.

**Ab 29.11.2009:** Zwergscharben müssen rückwirkend ab 2009 aus dem Neusiedler See-Gebiet nicht mehr an die AFK gemeldet werden (etablierter Brutvogel, Mauseergast, je nach Vereisung auch im Winter anwesend).